

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 220/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần dược Pha Nam

Địa chỉ: Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0862651638

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Osla Redi	VD-19618-13

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano. áp phích cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty cổ phần dược Pha Nam có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG

NGỪA MẮT ĐỎ

ĐỎ MẮT

Do bị kích ứng bởi



Thành phần: Mỗi lọ 15 ml chứa:

Tetrahydrozolin HCl

7,5 mg

Kèm sulfat

37,5 mg

Chỉ định

Điều trị các triệu chứng ngứa mắt, đỏ mắt, rất mắt, chóng sung huyết kết mạc, các trường hợp dị ứng và kích thích nhẹ ở mắt, trị mọi mắt, mờ mắt, các triệu chứng đỏ mắt do yếu tố kích ứng như: khói, bụi, nước vào mắt khi bơi lội, hay do đeo kính áp tròng

Lưu ý dùng và cách dùng:

Nhỏ mỗi bên mắt 1-2 giọt x 4 lần/ngày

Chống chỉ định

Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không nên sử dụng ở những bệnh nhân bị tăng nhãn áp.

Thận trọng

trước khi dùng thuốc này cần thông báo cho bác sĩ biết nếu có tiền sử bị tăng nhãn áp, bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, nhiễm khuẩn ở mắt, cường giáp.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai chỉ nên dùng thuốc này khi cần thiết, chưa rõ thuốc này có bị tiết qua sữa qua mẹ hay không, thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

Tác dụng không mong muốn

Sau khi dùng thuốc có thể xuất hiện các tác dụng phụ: mờ mắt, nhức mắt

Tương tác thuốc

Không nên dùng đồng thời thuốc này đồng thời với các thuốc ức chế monoamine oxydase (IMAO), thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử lý: Triệu chứng quá liều có thể bao gồm buồn ngủ, đỏ mắt, hắt hơi, nhiều, giảm thân nhiệt

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

sản xuất



ONCUP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam

www.merapgroup.com

OSLA
REDI

15 ml



THUỐC NHỎ MẮT ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG
NGỪA MẮT ĐỎ MẮT DO KÍCH ỨNG



Dung tích mới 15 ml

02/08/2019

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của QLD:/XNQCngày....tháng....năm.....

OSLA
REDI

15 ml

Kích thước bản in = 50% kích thước thật