

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 221/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH MTV Dược Phan Nam Hà Nội

Địa chỉ: Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 043 783 3848

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Osla Redi	VD-19618-13

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano. áp phích cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH MTV Dược Phan Nam Hà Nội có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt





ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG

NGỪA MẮT ĐỎ MẮT

Do bị kích ứng bởi



KHOI BỤI **NƯỚC HỒ BƠI** **KINH ÁP TRÔNG**
Thành phần: Mỗi lọ 15 ml chứa:
Tetrahydrozolin HCl 7,5 mg
Kẽm sulfat 37,5 mg

Chỉ định

Điều trị các triệu chứng ngứa mắt, đỏ mắt, rất mắt, chóng sung huyết, kết mạc, các trường hợp dị ứng và kích thích nhẹ ở mắt, từ môi mắt, mở mắt các triệu chứng đỏ mắt do yếu tố kích ứng như: khói, bụi, nước vào mắt khi bơi lội, hay do đeo kính áp trong

Liều dùng và cách dùng:

Nhỏ mỗi bên mắt 1-2 giọt x 4 lần/ngày

Chống chỉ định

Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không nên sử dụng ở những bệnh nhân bị tăng nhãn áp.

Thận trọng

Trước khi dùng thuốc này cần thông báo cho bác sỹ biết nếu có tiền sử bị tăng nhãn áp, bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, nhiễm khuẩn ở mắt, cường giáp.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai chỉ nên dùng thuốc này khi cần thiết, chưa rõ thuốc này có bị tiết qua sữa mẹ hay không, thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

Tác dụng không mong muốn

Sau khi dùng thuốc có thể xuất hiện các tác dụng phụ: mờ mắt, nhức mắt

Tương tác thuốc

Không nên dùng đồng thời thuốc này đồng thời với các thuốc ức chế monoamine oxydase (IMAO), thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử lý:

Triệu chứng quá liều có thể bao gồm buồn ngủ, đỏ mắt, hơi nhiều, giảm thân nhiệt

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

sản xuất **MERAP** GNCAP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
www.merapgroup.com



15 ml



THUỐC NHỎ MẮT ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG NGỪA MẮT ĐỎ MẮT DO KÍCH ỨNG



Dung tích mới 15 ml

0102/He/V
SMAK

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của QLD:/XNQ/ngày.....tháng.....năm.....



15 ml

Kích thước bản in = 50% kích thước thật