

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 227/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 13. tháng 4... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **VPDD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd.**

Địa chỉ: **Phòng 706, tầng 7, số 111A đường Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 7300 1299**

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Betadine Throat Spray (mẫu 3)	VN-20326-17

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi, internet cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

VPDD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd. có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG



BETADINE® throat spray



Số Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxx/xxxx-
/XNQC-QLD, ngày xx/xx/xxxx,
Ngày in tài liệu xx/xx/xxxx Tài liệu gồm 2 mặt.
Thông tin sản phẩm xem mặt 2.

Phương tiện quảng cáo:

- Trên tờ rơi, tỉ lệ từ 1:1 đến 1:2
- Trên bảng, biển, panô theo tỉ lệ từ 1:1 đến 1:50
- Vật phẩm trưng bày tại nhà thuốc, từ tỉ lệ 1:1 đến 1:20
- Báo điện tử, website của doanh nghiệp, website của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo: Trang 1 xuất hiện trước, có nút bấm chuyển sang trang 2 và đứng yên để người đọc tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm cho đến khi muốn tắt đi hoặc quay lại trang 1

11/7/17

JS

MẤU 3



BETADINE® throat spray

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Thành phần: Povidon-iod 0.45% kl/tt **2. Chỉ định:** Dùng điều trị các bệnh nhiễm trùng cấp tính niêm mạc miệng / họng như: Viêm họng, viêm amidan, viêm miệng, viêm nước, loét miệng aphter, nhiễm nấm candida, cảm và cúm. Để vệ sinh răng miệng trước, trong và sau khi phẫu thuật nha khoa và vùng miệng. **3. Liều dùng và cách dùng:** Dùng tại chỗ (miệng và họng). Xịt vào niêm mạc họng vài lần một ngày (cách mỗi 3-4 giờ). **4. Chống chỉ định:** Không dùng thuốc khi mắc cảm với iod, povidon hoặc bất kỳ thành phần tá dược; các bệnh lý liên quan tuyến giáp; trước và sau điều trị bằng iod phóng xạ, cho đến khi đã khỏi bệnh trong thời gian dài. Không dùng thuốc trong vòng 4 tuần trước khi xạ hình bằng iod phóng xạ hoặc điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp bằng iod phóng xạ; bệnh nhân bị bướu cổ, nhân tuyến giáp, hoặc các bệnh tuyến giáp khác (đặc biệt là bệnh nhân cao tuổi) có nguy cơ bị tăng năng tuyến giáp do dùng lượng lớn iod; bệnh nhân điều trị đồng thời lithium; trẻ em dưới 6 tuổi. **5. Cảnh báo và thận trọng khi dùng:** Thận trọng khi dùng thường xuyên trên da bị tổn thương ở bệnh nhân suy thận. Chỉ dùng ở miệng / họng. Không bôi lên da. Ngừng sử dụng khi kích ứng tại chỗ hoặc mắc cảm. Để xa tầm tay trẻ em. **6. Phụ nữ có thai và cho con bú:** chỉ dùng thuốc theo chỉ định chặt chẽ của bác sĩ và dùng ở mức tối thiểu, do iod được hấp thu có thể vượt qua hàng rào nhau thai và có thể bài tiết vào sữa mẹ.

Povidon-iod có thể gây suy giáp thoáng qua trên thai nhi / trẻ sơ sinh; nên tránh dùng povidon-iod ở trường hợp này. Cần kiểm tra chức năng tuyến giáp của trẻ, đặc biệt là ở những vùng có lượng iod trong chế độ ăn thấp và có xu hướng bị bệnh bướu cổ. **Hãy thông báo với bác sĩ mọi tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng** Nhà sản xuất: Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus. Nhà nhập khẩu: Vimedimex Bình Dương, Lô 18 L1-2, VSIP II, đường số 3, KCN Việt Nam-Singapore 2, Thủ Dầu 1, Bình Dương. Liên hệ: VPDD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP.HCM. ĐT: (08) 73001299

®: **BETADINE** là nhãn hiệu đã được đăng ký của Mundipharma



Handwritten signature or mark.

