

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Calcium corbiere	VD-19429-13
2		

Đơn đề nghị số: 73-090817/ssv/cal

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi-Synthelabo VN

Địa chỉ: Số 10 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

Phương tiện quảng cáo: Trên bảng, biển quảng cáo cho công chúng

Số giấy xác nhận: 285./2017/XNQC/QLD

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

THÔNG TIN QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE

KÍCH THƯỚC THẬT: 45,16cm x 84,88cm; 19,8cm x 111,9cm

SANOFI



CHO XƯƠNG CHẮC KHOẺ

TÊN THUỐC:
CALCIUM CORBIÈRE®

THÀNH PHẦN:
Ống 5ml: 0,55g Calci glucoheptonat; 0,05g Vitamin C; 0,025g Vitamin PP
Ống 10ml: 1,1g Calci glucoheptonat; 0,1g Vitamin C; 0,05g Vitamin PP

CHỈ ĐỊNH:
Tình trạng thiếu calci như: chứng còi xương, chế độ ăn thiếu calci, trong thời kỳ nhu cầu calci cao (trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai và cho con bú, giai đoạn phục hồi vận động khi bị gãy xương sau một thời gian bị bất động kéo dài). Hỗ trợ điều trị loãng xương, phòng ngừa tình trạng giảm khoáng hoá xương ở giai đoạn tiền và hậu mãn kinh, dùng corticoid.

LIỀU & CÁCH DÙNG:
Ống 5ml: Trẻ em: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa.
Ống 10ml: Người lớn: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ống/ngày uống vào buổi sáng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với thành phần của thuốc; tăng calci huyết, calci niệu; sỏi calci; u ác tính phá huỷ xương; loãng xương do bất động lâu ngày; suy tim và suy thận. Tránh dùng liều cao vitamin C ở những người có tình trạng dư acid, xơ gan, bệnh gút, nhiễm toan ống thận, hoặc tiểu hemoglobin kịch phát về đêm. Tránh dùng liều cao vitamin C ở bệnh nhân suy thận, do tăng nguy cơ suy thận. CALCIUM CORBIÈRE® có chứa vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng.

TÁC DỤNG PHỤ:
Rối loạn tiêu hoá (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn) đỏ bừng mặt, cổ, ngứa, cảm giác rất bỏng, buồn hoặc đau nhói ở da. Tác dụng không mong muốn của Vitamin C: >1/100 tăng oxalat niệu. >1/1.000 đến <1/100: Máu, thiếu máu tán huyết; Tim mạch: đỏ bừng mặt, suy tim; Thần kinh trung ương: chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi; Dạ dày-ruột: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:
Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, tiền sử sạn đường tiết niệu; có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, gút, viêm khớp do gút. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, hoặc sau khi ngưng mạch vành. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. Cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong CALCIUM CORBIÈRE® (2,5g đường/ống 5ml, 5g đường/ống 10ml). Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ. Không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cùng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

NHÀ SẢN XUẤT:
Công ty CP DP Sanofi – Synthelabo VN, 15/6C Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty CP DP Sanofi - Synthelabo Việt Nam, 15/6 C Đặng Văn Bi, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
ĐT: (+84.8) 3896 6905, fax: (+84.8) 3896 0031. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc số: .../.../... XNQC-QLD, ngày .../.../...
In tài liệu .../.../... Số đăng ký: VD-19429-13.

26/9/17 *Ms*

SAVN.CGAAN.17.07.0172