

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Eymiru Wash	VN-19492-15

Đơn đề nghị số: 01/VH

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

Địa chỉ: 04 Lô A Trường Sơn, F15, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0318 /2017/XNQ/QLD

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**


Nguyễn Tất Đạt

love.
ION



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Sơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN
XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ. GIỮ TỜ HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐỌC KHI CẦN.

Eyemiru Wash

Dung dịch rửa mắt. Hộp 1 lọ 500mL

ĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG DỊCH RỬA MẮT EYEMIRU WASH

- Rửa mắt với nắp.
- Dùng tại nhà và văn phòng để:
 - Dùng để rửa mắt.
 - Phòng chống bệnh về mắt (sau khi bơi, khi bị bụi bẩn bám vào mắt).

(Signature)

Sản xuất tại: Nitto Medic.Co., Ltd. Địa chỉ: 1-14-1 Yasuuchi Yatsuo-machi Toyama-City, Toyama, Japan
Nhà đăng ký: Lion Corporation. Địa chỉ: 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-Ku, Tokyo - Japan. Điện thoại: +81-3-3621-6211

Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

Địa chỉ: Số 4, Lô A, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 18001104 hoặc 028 397 03695

Tài liệu này gồm có 4 trang. Thông tin sản phẩm xin xem trang 2, 3, 4

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế/XNQC....., ngày tháng năm

Chú ý khi sử dụng

- 1. Cần sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ trong những trường hợp sau:**
 - (1) Đang được điều trị y tế hoặc sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt và mỡ mắt khác.
 - (2) Có thể bị dị ứng hoặc có tiền sử dị ứng với các thành phần của dung dịch rửa mắt.
 - (3) Bị đau mắt nghiêm trọng.
 - (4) Nhạy cảm với bất kì thành phần nào của dung dịch rửa mắt.
- 2. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của sản phẩm lên phụ nữ có thai và cho con bú.**
- 3. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của sản phẩm đến người vận hành máy móc, tàu xe.**
- 4. Chú ý trước khi sử dụng:**
 - (1) Chỉ sử dụng để rửa mắt.
 - (2) Không sử dụng khi dung dịch rửa mắt bị chuyển màu hoặc bay hơi.
 - (3) Có thể sử dụng cho trẻ nhỏ dưới sự giám sát của người lớn.
 - (4) Tẩy trang và rửa sạch bụi bẩn quanh mắt trước khi sử dụng.
 - (5) Không sử dụng lại dung dịch đã dùng.
 - (6) Rửa sạch cốc bằng nước trước và sau khi sử dụng, sau đó bảo quản khô ráo.
 - (7) Không sử dụng khi đang đeo kính áp tròng.
 - (8) Không sử dụng chung cốc với người khác.
- 5. Ngừng sử dụng và mang tờ hướng dẫn này đến xin lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ trong những trường hợp sau:** Nổi mề đay, phát ban đỏ, sung huyết, ngứa hoặc dị ứng, sưng mắt, nóng hoặc đau trong mắt. Hoặc cảm giác phát ban, ngứa xảy ra trên da sau khi sử dụng.
- 6. Chú ý khi bảo quản và sử dụng:**
 - (1) Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.
 - (2) Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
 - (3) Sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp. Không dùng khi sản phẩm hết hạn.
 - (4) Tránh xa tầm tay trẻ em.
 - (5) Không bảo quản trong hộp khác để tránh nhầm lẫn và giảm chất lượng sản phẩm.
 - (6) Không dùng chung sản phẩm với người khác.

• Quá liều

Không có thông tin.

• Tác động không mong muốn

Dung dịch rửa mắt có thể gây ngứa, đỏ mắt trong một vài trường hợp. Hỏi bác sĩ và các chuyên gia về mắt trong trường hợp có các tác động không mong muốn.

• Tương tác với các thuốc khác

Không có thông tin.

SĐK: VN-19492-15

• Sản xuất tại:

NITTO MEDIC. Co., Ltd.

Địa chỉ: 1-14-1 Yasuuchi Yatsuo-machi Toyama-City,
Toyama, Japan (Nhật Bản).

• Nhà đăng ký:

LION CORPORATION

Tokyo, Japan (Nhật Bản)

Tel: +81-3-3621-6211

- **Thành phần hoạt chất (trong 500mL)**

ϵ -Aminocaproic Acid: 500 mg, Chlorpheniramine Maleate: 15 mg, Pyridoxine Hydrochloride: 25 mg, Panthenol: 25 mg, d- α -Tocopherol Acetate: 25 mg, Potassium L-Aspartate: 250 mg, Taurine (2-Aminoethanesulfonic acid): 250 mg

- **Tá dược**

Disodium Edetate Hydrate, Dung dịch Clorua benzalkonium (10%), Poly-oxy-ethylene Hydrogenated Castor Oil 60, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxy-ethylcellulose, l-Menthol, dl-Camphor, Sodium Hydroxide và nước tinh khiết.

**Xuất xứ công thức trong cuốn “Quy trình phê duyệt và cấp phép thuốc OTC Nhật Bản”.*

- **Dược lực học**

ϵ -Aminocaproic Acid: giúp giảm viêm bằng cách hạn chế chức năng của plasmin gây viêm mắt.

Chlorpheniramine Maleate: là chất kháng histamine giúp ức chế sự liên kết giữa histamine và thụ thể, giảm ngứa và viêm mắt (do dị ứng).

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6): bị phốt pho hoá trong cơ thể và tham gia thúc đẩy quá trình trao đổi chất của protein/amino acid/lipid (giảm mỏi mắt).

Panthenol: được chuyển hoá thành Vitamin B5 trong cơ thể, giúp cung cấp năng lượng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

d- α -Tocopherol Acetate (Vitamin E): thúc đẩy tuần hoàn máu ngoại vi, giúp cung cấp ô-xy và dưỡng chất đến các mô mắt.


Potassium L-Aspartate: là một amino acid giúp sản sinh năng lượng, tăng cường sự hô hấp của các mô mắt, tạo điều kiện cho việc trao đổi chất của mắt, giảm mỏi mắt.

Taurine: là chất được tìm thấy trong các tổ chức cấp cao của hệ thống thị giác, võng mạc, và trong nước mắt. Taurine tăng cường sự phục hồi của giác mạc nhờ hoạt động như một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mô mắt.


• Hướng dẫn sử dụng

Ấn vào phần nắp có ghi chữ “Push” để mở.
(Khi muốn đóng lại, hãy bấm vào phía đối diện của nắp)

Cách mở nắp:



Cách đóng nắp:



① Ấn vào nắp để mở.



② Đổ dung dịch vào cốc dính kèm cho đến vạch được đánh dấu trong cốc.



③ Đặt cốc vừa khít với mắt của bạn.



④ Ngửa đầu lên trong khi giữ cốc vừa với mắt để tránh dung dịch tràn ra ngoài.



⑤ Nháy mắt vài lần để rửa mắt.



⑥ Đổ dung dịch đi và rửa sạch cốc. Sau đó làm lại từ bước 1 cho mắt còn lại.



* Chúng tôi sử dụng lọ màu để bảo vệ hỗn hợp Vitamin khỏi ánh sáng.
Dung dịch trong suốt không màu.

• Chỉ định

Dùng để rửa mắt, phòng chống bệnh về mắt (sau khi bơi, khi bị bụi bẩn bám vào mắt).

• Chống chỉ định

Không sử dụng cho người bị dị ứng với các thành phần của dung dịch rửa mắt.

• Liều lượng và cách sử dụng

Rửa mỗi mắt với 5mL dung dịch, 3 đến 6 lần một ngày, hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ.

