

Số: *46* /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày *23* tháng *03* năm 201 *7*.

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam**

Địa chỉ: **10 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM**

Điện thoại: 848 38298526

Fax: (Số fax)


STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Calcium corbiere	VD-19429-13

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, áp phích, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông, vật dụng trưng bày cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 1 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

"Kích thước thật: ngang 25cm x dọc 25cm. Tỷ lệ 1:2 đến 1:50"

CALCIUM
corbière®



CHO XƯƠNG CHẮC KHỎE, CỨNG CẤP



TÊN THUỐC: Calcium Corbière®. **THÀNH PHẦN:** Ống 5ml: 0.55g Calci glucoheptonat, 0.05g Vitamin C, 0.025g Vitamin PP - Ống 10ml: 1.1g Calci glucoheptonat, 0.1g Vitamin C, 0.05g Vitamin PP. **CHỈ ĐỊNH:** tình trạng thiếu calci như: chứng còi xương, chế độ ăn thiếu calci, trong thời kỳ nhu cầu calci cao (trẻ em đang lớn, **phụ nữ mang thai và cho con bú**, giai đoạn phục hồi vận động khi bị gãy xương sau một thời gian bị bất động kéo dài). Hỗ trợ điều trị loãng xương, phòng ngừa tình trạng giảm khoáng hóa xương ở giai đoạn tiền và hậu mãn kinh, dùng corticoid. **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Ống 5ml: Trẻ em: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ống 10ml: Người lớn: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ống/ngày uống vào buổi sáng. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc; tăng calci huyết, calci niệu; sỏi calci; u ác tính phá hủy xương; loãng xương do bất động lâu ngày; suy tim và suy thận. **TRINH DÙNG LIỀU CAO VITAMIN C** ở những người có tình trạng dư acid, xơ gan, bệnh gút, nhiễm toan ống thận, hoặc tiểu hemoglobin kích phát về đêm. **TRINH DÙNG LIỀU CAO VITAMIN PP** không dùng cho người bệnh gan nặng, loét da dày tiến triển, xuất huyết đông mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn), đỏ bừng mặt, cổ, ngứa, cảm giác rât bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da. Tác dụng không mong muốn của vitamin C: >1/100 tăng oxalat niệu, >1/1.000 đến <1/100: Máu, thiếu máu tán huyết; Tim mạch: đỏ bừng mặt, suy tim; Thần kinh trung ương: chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi; Dạ dày-ruột: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **THẬN TRỌNG:** Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, tiền sử sạn đường tiết niệu; có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, gút, viêm khớp do gút. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, hoặc sau khi ngưng mạch vành. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. Cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbière (2.5g đường/ống 5ml, 5g đường/ống 10ml). Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ. Không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cùng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NHÀ SẢN XUẤT:** Công ty Cp DP Sanofi - Synthelabo VN, 15/6C Đường Văn Bì, Thủ Đức, TP. HCM. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Cp DP Sanofi - Synthelabo Việt Nam, 15/6 C Đường Văn Bì, Quận Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: (+84.8) 3896 6905, fax: (+84.8) 3896 0031. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc số: .../.../ XNQC-QLD, ngày .../.../... In tài liệu .../.../... **Số đăng ký:** VD-19429-13. VN.CAC.16.11.15

SANOFI

15/3/17 Ag