

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52 /2017/XNQ-CQLD

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **VPĐD Ipsen Pharma tại TP. Hà Nội**

Địa chỉ: **Phòng 302, tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Điện thoại: **04 3942 3946**

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Smecta (mẫu 2)	VN-19485-15

Phương tiện quảng cáo: trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

VPĐD Ipsen Pharma tại TP. Hà Nội có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



SIZE: A4 GẤP 3 (9.5 x 21cm)

Mặt sau

28/3/17



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy

THÔNG TIN SẢN PHẨM SMECTA
HOẠT CHẤT CHÍNH: Diosmectite: 3g/gói. **DẠNG BAO CHẾ:** Hộp chứa 30 gói bột pha hỗn dịch uống. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng trong tiêu chảy cấp ở trẻ em, trẻ nhũ nhi và người lớn, kết hợp với việc bổ sung nước và các chất điện giải đường uống. Điều trị các triệu chứng trong tiêu chảy mạn tính. Điều trị triệu chứng các chứng đau liên quan tới rối loạn thực quản, dạ dày, tá tràng và ruột.
LIỀU DÙNG: Điều trị tiêu chảy cấp: Trẻ em và trẻ nhũ nhi: Dưới 1 tuổi: 2 gói/ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 1 gói/ngày. Trên 1 tuổi: 4 gói/ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 gói/ngày. Người lớn: Trung bình 3 gói/ngày. Trên thực tế, liều hàng ngày có thể tăng gấp đôi trong những ngày đầu điều trị. Trong các bệnh khác: Dưới 1 tuổi: 1 gói/ngày. Từ 1 đến 2 tuổi: 1 đến 2 gói/ngày. Từ 2 tuổi trở lên: 2 đến 3 gói/ngày. Người lớn: Trung bình 3 gói/ngày. **CÁCH DÙNG:** Dùng đường uống. Khối lượng thuốc trong gói phải được pha thành hỗn dịch ngay trước khi sử dụng. Nên dùng sau bữa ăn trong bệnh về thực quản. Giữa các bữa ăn trong các bệnh khác. **THẬN TRỌNG:** Diosmectite phải được dùng thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử táo bón nặng. Ở trẻ em, tiêu chảy cấp phải được điều trị phối hợp với việc dùng sớm dung dịch bù nước, điện giải đường uống (ORS) nhằm tránh mất nước và các chất điện giải. Thuốc chứa glucose và saccharose khuyến cáo không nên dùng cho bệnh nhân có rối loạn dung nạp fructose, hấp thu kém glucose và galactose hoặc những bệnh nhân thiếu enzym tiêu hóa sucrose và isomaltase. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không có dữ liệu xác đáng hiện có về việc sinh quái thai trên động vật của thuốc này. Do đặc tính không bị hấp thu của Smecta nên có thể cần nhắc sử dụng trong quá trình mang thai nếu thực sự cần thiết. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Dị ứng với Diosmectite hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. **BẢO QUẢN:** Nhiệt độ không quá 30°C. **HẠN DÙNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất. **NHA SẢN XUẤT:** Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Pháp. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**



Mặt trước



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy





Smecta có khả năng bao phủ rộng, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.
Smecta điều trị hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn.

SẢN XUẤT TẠI BEAUFOR IPSSEN INDUSTRIE, PHÁP



Ngày in tài liệu: / /

Tài liệu gồm 02 trang, thông tin sản phẩm xin xem trên trang 2

Tỉ lệ: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10