

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **98** /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày..**24**. tháng..**4**... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited**

Địa chỉ: **Tầng 7, tháp A, toà nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã , quận Ba Đình, Hà Nội**

Điện thoại: **043 733 7486**

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Estraceptin	VN-17085-13

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, pano, băng rôn, phương tiện giao thông, standee cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Estraceptin®

Tránh thai hiệu quả⁽¹⁾

NGUYỄN
20/09/2018



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, THAM KHẢO Ý KIẾN BÁC SĨ NẾU CẦN. ■ THÀNH PHẦN: 21 viên bao phim màu trắng chứa: Desogestrel 0,150 mg, Ethinyl Estradiol 0,020 mg. 2 viên bao phim màu xanh lục chứa tá dược. 5 viên bao phim màu vàng chứa: Ethinyl Estradiol 0,010 mg. ■ **CHI ĐÌNH:** Tránh thai. ■ **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Uống viên số 1 (ghi ở mặt sau hộp nhưa) vào ngày đầu tiên của kỳ kinh. Uống mỗi ngày 1 viên theo thứ tự: 21 viên trắng, 2 viên xanh, 5 viên vàng, giữ đúng trình tự theo số và chiều mũi tên cho tới khi hết vi. Khi hết viên cuối cùng của vi cũ, chuyển sang uống viên số 1 của vi mới vào hôm sau, cho dù chưa thấy kinh hoặc đã ngưng kinh. Cần ghi nhớ ngày uống viên số 1 (ngày 1) và các ngày 8, 15, 22 do luôn rơi vào cùng một ngày trong tuần, điều này giúp dùng thuốc đúng cách. Để tránh quên thuốc, nên uống vào cùng một thời điểm trong ngày. Nếu quên thuốc, uống ngay khi nhớ, không trễ quá 12 giờ sau giờ uống thuốc thường ngày. Nếu trễ quá 12 giờ, khả năng tránh thai không còn bảo đảm, tiếp tục uống những viên còn lại vào thời điểm thường kỳ và sử dụng thêm một biện pháp tránh thai phụ cho đến hết chu kỳ và thử thai trước khi dùng thuốc ở chu kỳ kế tiếp. ■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không được dùng trong các bệnh: huyết khối tắc mạch, tiền căn huyết khối tắc mạch; bệnh về mạch máu ở tim, não, hay mắt; suy thận; bệnh ác tính ở vú, tử cung hay tuyến yên phụ thuộc hormone; suy gan nặng hoặc khối phôi; xuất huyết đường sinh dục chưa được chuẩn đoán, purpura; bệnh xơ tai; tiểu đường; tăng lipid máu; chứng ứ mắt tái phát; tiền sử bệnh herpes khi mang thai; có thai; cho con bú; vàng da trong lúc mang thai không rõ nguyên do. ■ **Chống chỉ định tương đối:** rối loạn biến dưỡng, bệnh như bệnh phổi; tăng tiết sữa, với nồng độ prolactin cao; tiền sử sỏi mật chưa điều trị. ■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Có thể có các triệu chứng hiếm như tăng huyết áp, vàng da tắc mật, tăng lipid máu, tiểu đường, đau vú nặng, bệnh tuyến vú lành hoặc ác tính, bướu tử cung, bướu gan, tăng tiết sữa, cần được chuẩn đoán bệnh u tuyến yên, buồng non, nhức đầu, tăng trong; căng vú; dễ bị kích thích hoặc trầm cảm; nám da; chảy máu giữa các kỳ kinh; kinh nguyệt ít; nhiễm nấm candida âm đạo; ngứa cơ sở mật; có thể xuất hiện chứng không dung nạp nhân kinh sắt trong. Hỏi bác sĩ nếu có những tác dụng không mong muốn khác chưa được đề cập ở trên. ■ **THẬN TRỌNG KHI DÙNG:** Ngưng thuốc khi có các triệu chứng: nhức đầu nặng hoặc bất thường, thay đổi thị giác, tăng huyết áp. **Lưu ý:** Khám sức khỏe định kỳ trước và trong điều trị; Theo dõi đặc biệt ở bệnh nhân động kinh, nhức nửa đầu, hen, trầm cảm, có tiền sử gầy sút và ung thư vú. Trong trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Trong trường hợp có kế hoạch phẫu thuật, ngưng thuốc 1 tháng trước phẫu thuật và không được tiếp tục điều trị trong giai đoạn chưa đi lại được. Ngưng điều trị trong trường hợp phải nằm 1 chỗ lâu dài. ■ **TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC:** Thông tin cho bác sĩ tất cả thuốc đang dùng, kể cả thuốc không kê đơn. Tương tác có thể xảy ra: Dùng chung Triclosanomycline làm tăng nguy cơ vàng da ứ mật. Không dùng với các thuốc gây cảm ứng men như Barbiturat, Phenytoin, Primidone, Carbamazepin, Rifampin, Griseofulvin vì giảm tác dụng tránh thai. ■ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Phụ nữ có thai: Không dùng. Phụ nữ cho con bú: Không dùng. ■ **NGƯỜI LAI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không có báo cáo. ■ **QUẢ LIỀU VÀ XUẤT HIỆU:** Quả liều có thể gây buồn nôn, xuất huyết. Bên bác sĩ ngay. Nên tiến hành rửa da sạch, các liệu pháp nâng đỡ và duy trì cần thiết. Nếu dùng quá liều trên trẻ khi uống liều cao Estraceptin chưa được báo cáo. ■ **BẢO QUẢN:** Giữ nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C và xa tầm với trẻ em. ■ **TRÌNH BÀY:** Hộp 1 vi 28 viên bao phim gồm 21 viên trắng, 2 viên xanh lục, 5 viên vàng. ■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. ■ **TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG TCS:** NHÀ SẢN XUẤT: LABORATO-RIOS RECALCINES S.A., Carrascal No. 5670, Santiago, Chile. ■ **NPP:** Vimedimex Bình Dương, 18 L1-2, đường số 3 VSIP II, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương. ĐT: 1800-545402. Thông tin về sản phẩm xin gọi 0838242006. Tài liệu tham khảo (1) Hướng dẫn sử dụng thuốc. **Chú ý:** Giấy phép tại Việt Nam: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - 1 Maritime Square #12-01, Harbourfront Centre Singapore 099235.



Tên thuốc: Estraceptin (VN-17085-13)

(Mã số OC-008/05/2016-Ver.2, 01 trang, được in ngang khổ A4)

Stt	Phương tiện quảng cáo	Ghi chú tỷ lệ kích thước
1	Sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng	
2	Áp phích gắn tường, ốp quầy tại nhà thuốc	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật: từ 1: 4.5 - 1:90
3	Quảng cáo trên LCD	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật: 1:4.5
4	Pano quảng cáo ngoài trời	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật 1:200
5	Băng rôn ngoài trời	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật 1:32
6	Bảng quảng cáo trên xe bus	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật 1:100 Vị trí: thân xe buýt
7	Standee đặt tại nhà thuốc	Tỷ lệ kích thước của mẫu so với kích thước thật 1:8

