

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **01-01/QC/BCD/HEC-RA2017**

Của: **Công ty TNHH DKSH Việt Nam**

Địa chỉ: **23 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp VN-Sigapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: **08 3812 5848**

Đăng ký thông tin thuốc: **Stimol**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0017/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **23/03/2017**

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

STIMOL

CITRULLINE MALATE



23/3/17

[Signature]

Khuyến dùng trong các trường hợp **một mỗi do:**

- Trong thời kỳ dưỡng bệnh: sau nhiễm trùng, sau phẫu thuật.
- Suy nhược ở người lớn tuổi.
- Vận động viên

**Do không có chứa đường trong công thức, STIMOL® có thể dùng cho người bị bệnh tiểu đường*

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế:
XXXX/XX/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm 2016.
Ngày...tháng... năm 2016 in tài liệu.
Thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2

BIOCODEX 

STIMOL®

CITRULLINE MALATE



DẠNG ống

DẠNG gói nước

Pha loãng với nước, uống nhiều lần trong ngày, sau ăn

NGƯỜI LỚN
3 liều
1 NGÀY

TRẺ EM (trên 6 tuổi)
2 liều
1 NGÀY

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

THÀNH PHẦN

Citrullin malat..... 1.00 g
Tá dược: Hương cam sangria tự nhiên, dung dịch natri hydroxyd 30%, nước tinh khiết cho 1 ống 10 ml hoặc 1 gói 10 ml.
Hộp 18 ống hay 18 gói.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc này được khuyến dùng trong các trường hợp mệt mỏi như:

- Trong thời kỳ dưỡng bệnh: sau nhiễm trùng, sau phẫu thuật.
- Suy nhược ở người lớn tuổi.
- Vận động viên (giúp tăng cường hoạt động cơ và giảm mỏi cơ sau khi vận động).

Do không có chứa đường trong công thức, STIMOL® có thể dùng cho người bị bệnh tiểu đường.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường uống. Cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.

- Người lớn: 3 ống hoặc 3 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.
- Trẻ em: 2 ống hoặc 2 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.

Pha loãng thuốc trong ống hoặc gói trong một ly nước.

Thời gian điều trị giới hạn trong 4 tuần.

Cách dùng:

- Gói: 1- Cầm gói thuốc thẳng đứng, sau đó xé hoặc cắt một góc gói thuốc.
2- Đổ thuốc vào trong ly, dùng các ngón tay ép dọc theo phần thuốc còn lại trong gói.
3- Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có đường.
Ống: Dùng ngón cái và ngón trỏ bẻ 1 trong 2 đầu ống; đặt bên ống đã bẻ lên trên 1 ly và bẻ đầu thứ 2. Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có đường.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Trong trường hợp bệnh nhân theo chế độ kiêng muối, cần chú ý mỗi ống hoặc gói chứa khoảng 30 mg muối.
Do pH acid, nên pha loãng thuốc trong ống với một ly nước.
Nếu có nghi ngờ, đừng do dự hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC

Nhằm tránh các tương tác có thể có giữa các thuốc, cần báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết mọi điều trị khác đang theo.

MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Cho đến nay không có báo cáo lâm sàng nào về bất kỳ tác dụng gây dị dạng hoặc độc tính cho bào thai. Theo nguyên tắc chung, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào trong thời gian có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Stimol không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Như mọi thuốc khác, thuốc này có thể gây tác dụng khó chịu ở mức độ khác nhau ở một số người: hiếm có trường hợp nóng rất nhẹ ở dạ dày lúc bắt đầu điều trị.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

STIMOL® có chứa citrullin malat. Việc cung cấp malat, một thành phần chủ yếu của chu trình Krebs, làm giảm lactat trong máu bằng cách biến đổi chất thải này thành năng lượng và khôi phục quá trình tạo ra năng lượng ATP thông qua chu trình Krebs.

Citrullin là một acid amin tham gia vào chu trình ure và giúp loại bỏ amoni dư thừa dưới dạng ure. Citrullin malat được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 45 phút sau khi uống với nồng độ đạt được gấp 6 đến 15 lần so với nồng độ ban đầu. Nồng độ sẽ giảm xuống bằng nồng độ ban đầu sau 5-6 giờ. Phục hồi nhanh chóng biến mất khỏi huyết tương trước khi được bài tiết qua nước tiểu.

QUÁ LIỀU

Chưa ghi nhận trường hợp nào quá liều. Tuy nhiên, dùng quá liều có thể làm trầm trọng hơn tác dụng không mong muốn.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá ngày hết hạn dùng ghi ngoài bao bì.
Để xa tầm tay trẻ em. Không được tiêm dạng dung dịch uống đóng trong ống.

Nhà sản xuất:

BIOCODEX

Nhà máy: 1 avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais - Pháp

Nhập khẩu và phân phối:

Cty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

Số 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Lầu 1-2, Tòa nhà Etown 2

364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

Phone: +84 8 38125 848 - Fax: +84 8 38125 776

www.dksh.com.vn