

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **QC 09/2017/PN-HN/BYT**

Của: **Công ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội**

Địa chỉ: **Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hòa-Phường Yên Hòa-Quận Cầu Giấy-
Hà Nội**

Điện thoại: **043 7833 848**

Đăng ký thông tin thuốc: **Hemo Q Mom**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0186/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **13/07/2017**

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

HemoQ mom
Sắt phức hợp, acid folic & vitamin B12

Tài liệu dành cho cán bộ y tế **Trang 4**



HemoQ mom
Sắt phức hợp, acid folic & vitamin B12

Tài liệu dành cho cán bộ y tế **Trang 1**

Số giấy tiếp nhận HSDKTL thông tin thuốc của cục QLD - Bộ Y tế: / / QLD - TT. Ngày in tài liệu: / / .TL gồm 4 trang.
Thông tin chi tiết của sản phẩm xem trang 2,3

Sản xuất bởi **DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.** 35-14, Jeyakongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

HemoQ mom - Chỉ 01 viên mỗi ngày

Tài liệu dành cho cán bộ y tế **Trang 2**

HemoQ mom
Sắt phức hợp, acid folic & vitamin B12

HEMOQ MOM- CHỈ 1 VIÊN MỖI NGÀY

THÔNG TIN VỀ ĐỘ AN TOÀN (TRIỆU CHỨNG TRÊN DA DÀY - RUỘT)
Nghiên cứu trong vòng 12 tuần, trên ngẫu nhiên 72 người thiếu máu do thiếu sắt. Ngẫu nhiên uống 1 viên Fe fumarate hoặc 01 viên phức hợp sắt polysaccharide Iron complex - PIC (ferroglycine sulfate tương đương 150mg Fe)
Thông tin ghi nhận 6 triệu chứng: đau bụng, ợ nóng, buồn nôn, nôn, chóng mặt, và tiểu. Được thể hiện trên biểu đồ



Tài liệu dành cho cán bộ y tế **Trang 3**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần

Mỗi viên nang HemoQ Mom chứa:
Polysaccharide Iron complex 326.1mg (Tương đương Fe 150mg)
Cyanocobalamin 0.1% 25mg (Tương đương Cyanocobalamin 25 g)
Acid folic 1mg

Chỉ định

Phòng ngừa và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở nữ tuổi dậy thì, sinh sản, thai phụ và bà mẹ sau khi sinh, người thiếu dinh dưỡng, sau mổ, giai đoạn hồi phục sau bệnh nặng, bệnh nhân lọc máu...
Phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Liều lượng & cách dùng

• Người lớn: 1 viên/ lần/ ngày.

Chống chỉ định

Bệnh nhân mắc cảm cúm bất kỳ thành phần nào của thuốc, trẻ em dưới 12 tháng tuổi, bệnh nhân mắc chứng nhiễm sắc tố sắt, bệnh nhân thiếu máu không do thiếu sắt.

Thận trọng

Bệnh nhân rối loạn tiêu hóa như ung thư dạ dày-tá tràng, viêm ruột kết mạn tính,... bệnh nhân suy giảm chức năng tim mạch, bệnh nhân rối loạn chức năng thận, bệnh nhân giảm protein huyết, bệnh nhân đang dùng thuốc kháng andosteron, triamteren (do có thể xảy ra tình trạng tăng kali huyết).

Cảnh báo: Quá liều ở trẻ em dưới 6 tuổi có thể gây chết do ngộ độc. Trong trường hợp quá liều, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến trung tâm cấp cứu gần nhất.

Tương tác thuốc

Kháng sinh uống tetracyclin.
Thuốc kháng acid

Sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú

Nên dùng viên HemoQ Mom trong thời kỳ mang thai cũng như giai đoạn cho con bú.

Tác dụng không mong muốn

Có một vài biểu hiện bất thường về tiêu hóa nhưng không đáng kể: ngứa, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, táo bón, phân màu đen. Nếu tác dụng phụ gây khó chịu, có thể ngừng thuốc một thời gian rất ngắn để điều chỉnh rồi dùng tiếp.

Đóng gói

10 viên x 3 vỉ/ hộp.

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng

HẠN DÙNG: 36 Tháng

HemoQ mom - Chỉ 01 viên mỗi ngày

Phân phối bởi: Công Ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội
Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hòa - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội

HemoQ mom
Sắt phức hợp, acid folic & vitamin B12