

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **QC 18/2017/PN-BYT**

Của: Công ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội

Địa chỉ: Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Q. Cầu Giấy –
Hà Nội

Điện thoại: **043 783 3848**

Đăng ký thông tin thuốc: **Deawoong Trimafort**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0213/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **07/08/2017**

Hà Nội, ngày..11..tháng..8..năm 2017

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt





DAEWOONG TRIMAFORT



Điều trị các triệu chứng:

Tăng tiết axit dịch vị, khó tiêu, ợ nóng,
ợ chua ngược dạ dày thực quản, hoặc
đầy, ợ hơi

DAEWOONG
HÀ NỘI



Thuốc dạ dày

DAEWOONG TRIMAFORT



Hương cam



Giảm cơn đau, nóng rát dạ dày

Số giấy tiếp nhận HSDKTL thông tin thuốc của cục QLD - Bộ Y tế :/...../QLD-TT Ngày in tài liệu:/...../.....

TL gồm 2 trang. Thông tin chi tiết của sản phẩm xem trang 2



Thuốc dạ dày

DAEWOONGTRIMAFORT

Tài liệu thông tin dành cho cán bộ y tế - Trang 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Mỗi gói có chứa:

1. Aluminium hydroxide gel (13%) 1538,5 mg (200 mg Al_2O_3)
2. Magnesium hydroxide 400 mg

DƯỢC LỰC HỌC

DAEWOONGTRIMAFORT là một hỗn hợp hai thuốc kháng acid, nhôm hydroxyd có tác dụng kháng acid chậm và magne hydroxyd có tác dụng kháng acid nhanh. Mặt khác tác dụng phụ gây táo bón của nhôm cũng được cân bằng nhờ tác dụng làm tiêu chảy của magne

CHỈ ĐỊNH

DAEWOONGTRIMAFORT được uống để làm giảm những triệu chứng do tăng tiết acid dịch vị như: khó tiêu, ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc loét dạ dày, tá tràng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1-2 gói (10ml), uống 3 lần mỗi ngày sau các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ

Trẻ em trên 6 tuổi: 0,5 – 1 gói (10ml), uống 3 lần mỗi ngày, sau các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân thủng tá tràng, loét ruột kết, viêm ruột thừa
- Trẻ dưới 6 tuổi
- Tiền sản giật
- Bệnh nhân suy thận, nhiễm độc kiềm hoặc tăng magne huyết

THẬN TRỌNG

Thận trọng chung

Tuân theo chỉ định liều dùng, cách dùng

- không dùng thuốc quá 2 tuần trừ khi có chỉ định của thầy thuốc
- Muối Magne có thể gây trầm cảm hệ thần kinh trung ương. Muối nhôm phản ứng với phosphat tạo ra muối nhômphosphat không tan trong nước dẫn đến sự thiếu hụt phospho ở những bệnh nhân có chế độ ăn kém phospho

Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân tiêu chảy mạn tính hoặc suy thận
- Bệnh nhân bị táo bón, xuất huyết đường tiêu hóa hoặc trực tràng mà không chẩn đoán được

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Táo bón, tiêu chảy, phù, tăng magne huyết, giảm phosphat huyết, nhuyễn xương

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

- Thuốc kháng acid làm thay đổi hiệu quả của những thuốc khác, do đó không dùng đồng thời với thuốc khác trong vòng 2 giờ.

- Dùng chung với Tetracycline phải cách xa 2-3 giờ

Không dùng chung đồng thời với Flouroquinolone do thuốc làm giảm độ hấp thu của Flouroquinolone.

Không dùng chung với Norfloxacin và Ciprofloxacin vì gây sỏi niệu và độc tính trên thận. Không dùng chung với mecamlamine, methana-mine, sodium polystyren sulfonate resin

- Không dùng thuốc chung với mecamlamine, methana mine, sodium polystyrate resin

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai và cho con bú cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng thuốc này.

ĐÓNG GÓI: 10ml x 20 gói/ hộp

HẠN DÙNG: 36 tháng

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng.



Sản xuất bởi:



DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Đại phân phối bởi: Công Ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội
12H1 Khu Đô Thị Yên Hòa - P. Yên Hòa - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội