

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **QC 22/2017/PN-BYT**

Của: **Công ty cổ phần dược Pha Nam**

Địa chỉ: **Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **0862651638**

Đăng ký thông tin thuốc: **Trimafort**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0214/17/QLD-TT**


Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **19/07/2017**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Thuốc da dày
Trimafort

GIẢM CƠN ĐAU DẠ DÀY



Số giấy tiếp nhận HSDKTL thông tin thuốc của cục QLD - Bộ Y tế :/....../QLD-TT
TL gồm 2 trang. Thông tin chi tiết của sản phẩm xem trang 2

Ngày in tài liệu:/....../.....



Thuốc dạ dày Trimafort

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gói uống số 3 Trimafort với 3 thành phần mang lại hiệu quả cao

- $Mg(OH)_2$ phối hợp với $Al(OH)_3$ nên Trimafort hiệu quả cho đường tiêu hóa - không gây táo bón hoặc tiêu chảy
- Simethicon có tác dụng phá bọt nên chống đầy hơi rất hiệu quả

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói Trimafort 10ml chứa:

Nhôm hydroxyd gel.....	3030,3mg
(tương đương 400mg Al_2O_3)	
Magnesi Hydroxyd.....	800mg
Nhũ dịch Simethicon 30%.....	266,7mg
(tương đương 80mg Semethicon)	

CHỈ ĐỊNH:

Tăng tiết acid dịch vị: chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, khó tiêu, buồn nôn, ợ mửa
Đau dạ dày, nóng rát, khó chịu ở dạ dày ruột
Viêm loét dạ dày, tá tràng cấp và mạn tính

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: 1 gói/lần x 3 lần/ngày. Không dùng quá 6 gói mỗi ngày
Trẻ em: Theo sự chỉ dẫn của BS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận, phụ nữ có thai và cho con bú
Tránh dùng các thuốc có chứa nhôm lâu ngày do làm giảm lượng phosphat trong máu

TÁC DỤNG PHỤ: Ít gặp (táo bón, tiêu chảy, buồn nôn)

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không dùng chung với Norfloxacin và Ciprofloxacin vì gây sỏi niệu và độc tính trên thận
Không dùng chung với mecalmylamin, methenamin, sodium polystyren sulfonat resin, muối sắt, thuốc kháng H2, tetracylin, fluoroquinolon, ketoconazol, các thuốc dạng viên bao tan ở ruột. Dùng cách xa các thuốc này 1-2 giờ

Sản xuất bởi:



DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea



Phân Phối bởi : Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam
Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh