

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc QC 04/2017/PN-BYT

Của: Công ty cổ phần dược Pha Nam

Địa chỉ: Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0862651638

Đăng ký thông tin thuốc: Daewoong Trimafort

Hình thức thông tin thuốc: Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Số giấy tiếp nhận: 0215/17/QLD-TT

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 13/07/2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt




Thuốc dạ dày
DAEWOONG TRIMAFORT



Hương cam



Giảm cơn đau, nóng rát dạ dày


13/7/2018

Số giấy tiếp nhận HSDKTL thông tin thuốc của cục QLD - Bộ Y tế :/...../QLD-TT Ngày in tài liệu:/...../.....
TL gồm 2 trang. Thông tin chi tiết của sản phẩm xem trang 2



Thuốc dạ dày

DAEWOONGTRIMAFORT

Tài liệu thông tin dành cho cán bộ y tế - Trang 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Mỗi gói có chứa:

1. Aluminium hydroxide gel (13%) 1538,5 mg (200 mg Al₂O₃)
2. Magnesium hydroxide 400 mg

DƯỢC LỰC HỌC

DAEWOONGTRIMAFORT là một hỗn hợp hai thuốc kháng acid, nhôm hydroxyd có tác dụng kháng acid chậm và magne hydroxyd có tác dụng kháng acid nhanh. Mặt khác tác dụng phụ gây táo bón của nhôm cũng được cân bằng nhờ tác dụng làm tiêu chảy của magne

CHỈ ĐỊNH

DAEWOONGTRIMAFORT được uống để làm giảm những triệu chứng do tăng tiết acid dịch vị như: khó tiêu, ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc loét dạ dày, tá tràng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1-2 gói (10ml), uống 3 lần mỗi ngày sau các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ

Trẻ em trên 6 tuổi: 0,5 – 1 gói (10ml), uống 3 lần mỗi ngày, sau các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân thủng tá tràng, loét ruột kết, viêm ruột thừa
- Trẻ dưới 6 tuổi
- Tiền sản giật
- Bệnh nhân suy thận, nhiễm độc kiềm hoặc tăng magne huyết

THẬN TRỌNG

Thận trọng chung

Tuân theo chỉ định liều dùng, cách dùng

- không dùng thuốc quá 2 tuần trừ khi có chỉ định của thầy thuốc
- Muối Magne có thể gây trầm cảm hệ thần kinh trung ương. Muối nhôm phản ứng với phosphat tạo ra muối nhômphosphat không tan trong nước dẫn đến sự thiếu hụt phospho ở những bệnh nhân có chế độ ăn kém phospho

Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân tiêu chảy mạn tính hoặc suy thận
- Bệnh nhân bị táo bón, xuất huyết đường tiêu hóa hoặc trực tràng mà không chẩn đoán được

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Táo bón, tiêu chảy, phù, tăng magne huyết, giảm phosphat huyết, nhuyễn xương

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

- Thuốc kháng acid làm thay đổi hiệu quả của những thuốc khác, do đó không dùng đồng thời với thuốc khác trong vòng 2 giờ.

- Dùng chung với Tetracycline phải cách xa 2-3 giờ

Không dùng chung đồng thời với Flouroquinolone do thuốc làm giảm độ hấp thu của Flouroquinolone.

Không dùng chung với Norfloxacin và Ciprofloxacin vì gây sỏi niệu và độc tính trên thận. Không dùng chung với mecamlamine, methana-mine, sodium polystyren sulfonate resin

- Không dùng thuốc chung với mecamlamine, methana mine, sodium polystyrate resin

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai và cho con bú cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng thuốc này.

ĐÓNG GÓI: 10ml x 20 gói/ hộp

HẠN DÙNG: 36 tháng

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng.

in xuất bởi:



35-14, Jeyakongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Đại Phối bởi: Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam

436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

