

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **06/2017/QC/MG**

Của: **VPDD Mega Lifesciences Public Company Limited**

Địa chỉ: **Số 364 Cộng Hòa, Tòa nhà E-Town 1, Phường 13, Quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 3812 3166**

Đăng ký thông tin thuốc: **Livolin-H**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0285/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **19/7/2017**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**




Nguyễn Tất Đạt

Phospholipid đậu nành 300mg

LIVOLIN-H

Làm chậm và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ



14/7/17

TS



Bảo vệ và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, duy trì chức năng gan trong các trường hợp gan bị tổn thương do viêm gan virus, bệnh gan do nhiễm độc chuyển hóa.

LIVOLIN-H**Làm chậm
và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ****THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang mềm chứa:

Phospholipid đậu nành 300mg

Tá dược: Thành phần vỏ nang: gelatin, glycerin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH

- Bảo vệ và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, duy trì chức năng gan trong các trường hợp gan bị tổn thương do viêm gan virus, bệnh gan do nhiễm độc chuyển hóa (do nhiễm độc, ví dụ do nhiễm độc thuốc, nhiễm trùng, gan nhiễm mỡ do rượu, dinh dưỡng quá mức, đái tháo đường, suy dinh dưỡng nặng thể Kwasiorkor).

- Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp, bán cấp và viêm gan mạn tính.

- Làm chậm và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

- Hỗ trợ chăm sóc trước và sau phẫu thuật, đặc biệt trong phẫu thuật gan/túi mật.

LIỀU DÙNG

01 viên nang/ lần, 03 lần/ ngày.

Dùng sau bữa ăn hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng cho các bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Những trường hợp kém hấp thu có thể tăng nguy cơ gây tiêu chảy hoặc có mỡ trong phân khi sử dụng Livolin-H.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của phosphatidylcholine với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có tác dụng phụ rõ rệt nào được báo cáo. Đôi khi có thể gặp một số tác dụng phụ nhẹ như buồn nôn, tiêu chảy và tăng tiết nước bọt.

Thông báo cho Bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có thông tin về độ an toàn và hiệu quả của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, do đó không nên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Livolin-H không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU

Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát dưới 30°, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

SDK: VN - 18935 - 15

MEGA We care

**Nhà sản xuất:**

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate,
Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan
10280, Thái Lan.

Sản xuất theo nhượng quyền của:

MEGA LIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY.LTD.
Victoria 3810, Úc.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:

VPĐD Mega Lifesciences Public Company Limited tại Việt Nam

HCM: 364 Cộng Hòa, Tòa nhà E-town, Quận Tân Bình, ĐT: (028) 38123 166

Hà Nội: (024) 3664 3957

Email: cuscare@megawecare.com

Website: www.megawecare.com.vn

Phân phối bởi:

**Công ty TNHH Dược Liệu Trung Ương 2
Phytopharma Sài Gòn**

ĐC: 42 Châu Văn Liêm, P10, Quận 5, TP. HCM

Tiếp thị bởi:

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

ĐC: Tòa nhà E-town, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP. HCM.