

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc số: **GPM-ASTH-0003-VN**

Của: **VPĐD Boehringer Ingelheim International GmbH**

Địa chỉ: **39 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM**

Điện thoại: **08 37245294**

Đăng ký thông tin thuốc: **Berodual**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0286/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **14/9/2017**

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt




Boehringer
Ingelheim

Berodual

Ipratropium + Fenoterol

Dạng phối hợp thuốc kháng Cholinergic chỉ định cho bệnh nhân COPD và hen



Thuốc giãn phế quản để phòng ngừa và
điều trị các triệu chứng bệnh tắc nghẽn
đường hô hấp mãn tính (Hen - COPD)⁽¹⁾



THÔNG TIN KÊ TOA SẴN PHẨM BERODUAL®

THÀNH PHẦN: Mỗi liều xịt (nhất xịt) chứa: 21 mcg ipratropium bromide tương ứng với 20 mcg ipratropium bromide khan, 50 mcg fenoterol hydrobromide. Dạng

đường hô hấp mãn tính (Hen - COPD)⁽¹⁾



CHỈ GIỚI: BERODUAL® là một thuốc giãn phế quản đã được nghiên cứu và được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong điều trị các triệu chứng của bệnh hen suyễn và các bệnh khác của đường hô hấp.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác quản lý chất lượng và đặc biệt là quản lý rủi ro chất lượng có vai trò quan trọng và đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Nên điều chỉnh liều dùng theo yêu cầu của từng bệnh nhân. Ngoài từ kê đơn khác, nhưng liều sau đây được khuyến cáo cho

hơn, nếu khó thở không cải thiện sau 5 phút có thể dùng thêm 2 nhát xịt nữa. Nếu còn hen không thuyên giảm sau 4 nhát xịt thì có thể xịt thêm thuốc. Trong

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ĐOẠT - ĐÌNH XỊ DINH: LƯU CHO TÔI ẾM THEO CHỈ DINH CỦA BÁC SĨ VÀ DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA NGƯỜI LÒN. **CHÔNG CHỈ DINH:** BÉKODUAL® chống chỉ định cho những

ở những bệnh nhân cơ tim phì đại tắc nghẽn và loạn nhịp nhanh. **CANH BAO VÀ THÂN TRONG:** Quả mận: Có thể xuất hiện các phản ứng quá mẫn tức thì

thực thể quân pháp lý: Cũng như các thực thể khác BERODIA. Có thể đây có thể là quân pháp lý có thể để đưa tính mang. Nếu xét hiện có

ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

gió-cỏm gọc hệp, dầu mat) khi dùng dạng xit ipratropium bromide đơn chất hoặc kết hợp với một thuốc chủ vận beta₂ tiếp xúc với mat. Dầu mat hoặc khô chùi,

Nếu thấy xuất hiện phối hợp các triệu chứng trên, nên điều trị bằng thuốc có đồng tử và đi khám chuyên khoa ngay lập tức. Do đó bệnh nhân nên được hướng

PHẦN 3. Sau khi đánh giá kỹ lợi ích/ngại cơ đặc biệt khi sử dụng loại sản phẩm này, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số khuyến cáo:

[illegible]

hầu mai và tai nạn y văn ghi nhận hiện tượng hợp nhuộm thiếu màu cơ tim liên quan đến chất chu vận beta. Bệnh nhân đang bị bệnh tim nặng (như bệnh tim

lên. Nền tảng đánh giá các triệu chứng như khó thở và đau ngực do có thể bắt nguồn từ tim hoặc hệ hô hấp. Giảm kali máu: Điều trị với chất chủ vận

da dày-ruột. **Khó thở:** Trong những trường hợp cấp, khó thở diễn tiến xấu đi nhanh chóng thì nên đi khám bác sĩ ngay. **Điều trị lâu dài:** * Ở những bệnh nhân này

Đang sử dụng các thuốc chứa chất chủ vận beta như BEROVAL® một cách thường

liều thuốc chữa chất chu vân beta2 BERODUAL® vượt qua liều khuyến cáo trong thời gian dài là không thích hợp và có thể nguy hiểm. Trong những trường hợp

đe dọa tính mạng. Chỉ nên sử dụng các thuốc giảm đau thần kinh giao cảm khác cùng với BERODUAL® dưới sự giám sát y khoa. Cảnh báo ch

TUONG TAC: Các thuốc chủ vận beta, kháng cholinergic và dẫn xuất xanthine (như theophylline).

Đặc điểm của các loại thuốc kháng khuẩn

[illegible]

cho những anh nông gia tình nguyện làm việc ở vùng biên giới. Do đó không cần phải chờ đợi lâu. Do đó không cần phải chờ đợi lâu.

Vòng, do có thể làm tăng tác dụng chủ vận beta giao cảm. Các thuốc gây mê dạng hít halogen hydrocarbon như halothane, trichloroethylene và enflurane có thể

người cho thấy không có bằng chứng về tác dụng bất lợi trong thời kỳ của fenoterol hoặc ipratropium. Tuy nhiên, nên sử dụng thận trọng trong thời kỳ nhai là

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ và tài trợ của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

המחיר – מחיר המכירה הנמוך ביותר של המוצר במהלך תקופת התצפית.

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành

ti với BERODUAL®. Do đó nên khuyến bệnh nhân thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Nếu bệnh nhân có các tác dụng phụ như: ngứa trên thì nên tránh

viết và chỉ cần beta của BERODUAL®. Nếu bạn đang dùng thuốc khác, hãy nói cho bác sĩ của bạn biết.

המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2017 ב-1.5 מיליארד שקל, וב-2018 ב-1.7 מיליארד שקל. המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2019 ב-1.8 מיליארד שקל, וב-2020 ב-1.9 מיליארד שקל.

thủ và bôn chôn. *Rối loạn hệ miễn dịch*: phản ứng phân vệ, qua mản. *Rối loạn chuyên hóa và dinh dưỡng*: giấm, kali mầu. *Rối loạn tâm thần*: bôn chôn, lo

đầu mắt, phủ giác mạc, sung huyết kết mạc, nhìn thấy hào quang. *Rối loạn tìm mäch*: nhìn tìm nhanh, đánh trống ngực, loạn nhịp tim, rung nhĩ, nhịp nhanh trên

Bài học

bon, như mình: *Koi loan va vo duoc da*: may day, như bạn, ngà, như mình, đang đi vào nơi: *Koi loan co xuong khop va mo nen ket*: yau cõ, cõ mai

GmbH & Co. KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany. **Nhà phân phối:** Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Binh Duong. Số 18

Ngày tháng năm XXXX in tại lieu.

(1) Thông tin kế toán sản phẩm; COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính