

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung thông tin thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	New Ameflu Expectorant	VD-16960-12

Đơn đề nghị số: 21/OPV-TT

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Địa chỉ: Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hoà, Đồng Nai

Hình thức thông tin thuốc: Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Số giấy xác nhận: 0326/2017/XNTT/QLD-*man*

Hà Nội, ngày *08* tháng *11* năm 2017

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG *[Signature]*



Nguyễn Tất Đạt






GIẢI NHANH HO ĐÀM



Điều trị ho đàm

Giúp long đàm,
làm loãng dịch tiết phế quản
để dễ ho khạc ra ngoài

HƯƠNG CAM



NEW AMEFLU® EXPECTORANT SIRO AMEFLU LONG ĐÀM

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml si rô chứa:

Guaifenesin50 mg Phenylephrin HCl.....5 mg

CHỈ ĐỊNH: Giúp long đàm (dịch nhầy), làm loãng dịch tiết phế quản, để dễ ho ra ngoài hơn. Giảm tạm thời sự sung huyết mũi (nghe mũi) và xoang, chảy nước mũi khi bị cảm lạnh. **CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:** Trẻ em dưới 4 tuổi: tham khảo ý kiến bác sĩ. Trẻ em từ 4 đến dưới 6 tuổi: uống ½ muỗng cà phê (2,5 ml)/ lần, cách mỗi 4 giờ. Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: uống 1 muỗng cà phê (5 ml)/ lần, cách mỗi 4 giờ. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn: uống 1-2 muỗng cà phê (5-10 ml)/ lần, cách mỗi 4 giờ. Không dùng quá 6 liều trong 24 giờ hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đang dùng các thuốc IMAO (một vài thuốc điều trị trầm cảm, bệnh lý tâm thần hay cảm xúc, hoặc bệnh Parkinson). **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Thuốc có thể gây: Nhịp tim nhanh, mạnh hoặc rối loạn, chóng mặt, lo âu, mệt mỏi, sốt, ớn lạnh, tăng huyết áp, mất ngủ, đau đầu, người yếu, run rẩy, da nhợt nhạt, ảo giác. Một số trường hợp dị ứng với thuốc như: phát ban, khó thở, sưng mặt, môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Dùng đồng thời phenylephrin với alcaloid nấm cựa gà (ergotamin và methylsergid): làm tăng ngộ độc nấm cựa gà. Dùng đồng thời phenylephrin với digoxin: làm tăng nguy cơ nhịp tim không đều hoặc cơn đau tim. Không dùng thuốc này nếu bạn đang dùng các thuốc ức chế IMAO. Dùng đồng thời phenylephrin với các amin có tác dụng giống thần kinh giao cảm, Thuốc chống trầm cảm ba vòng có thể làm gia tăng các tác dụng không mong muốn về tim mạch. Phenylephrin có thể làm giảm hiệu lực của các thuốc chẹn beta và các thuốc chống tăng huyết áp, không dùng đồng thời phenylephrin với alcaloid nấm cựa gà, digoxin. **LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:** Trẻ em dưới 4 tuổi. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu xảy ra cảm giác bồn chồn, chóng mặt hoặc mất ngủ, các triệu chứng không cải thiện trong vòng 7 ngày hoặc có kèm theo sốt. Phải có sự hướng dẫn của bác sĩ trong các trường hợp sau: các chứng ho dai dẳng hay mạn tính, viêm phế quản mạn tính hoặc khi phế quản hoặc ho có đờm nhiều, có bệnh tim, huyết áp cao, bệnh tuyến giáp, tiểu đường, tiểu khó do phì đại tuyến tiền liệt, suy thận nặng hoặc suy gan, người cao tuổi. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng thận trọng. **Phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

NHÀ SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV - Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm... Ngày tháng năm in tài liệu.



Signature
18.10.2017