

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc số: **368/CV-RVN**

Của: **Công ty Roussel Việt Nam**

Địa chỉ: **702 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 39 31 55 18**

Đăng ký thông tin thuốc: **Coltramyl 4 mg (mẫu 2 trang)**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0491/16/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **29/03/2017**

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt


Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Coltramyl® 4mg

Thiocolchicoside



Thuốc giãn cơ hiệu quả



Thông tin tóm tắt sản phẩm xin xem trang sau
Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của CQLD-BYT:
Ngày in tài liệu:

Coltramyl® 4mg hiện đang có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

ROUSSEL VIETNAM 

www.rousselvietnam.com.vn

Coltramy^l 4mg

Thiocolchicoside

Thuốc giãn cơ hiệu quả

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

Thiocolchicoside4mg

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén.

CHỈ ĐỊNH

Coltramy^l được chỉ định cho người lớn (trên 15 tuổi) để điều trị hỗ trợ các cơn co thắt gây đau trong:

- Bệnh lý thoái hóa đốt sống và rối loạn tư thế cột sống: vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
- Bệnh lý do chấn thương, thần kinh (với sự co cứng).
- Phục hồi chức năng.
- Đau bụng kinh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Chỉ dùng thuốc cho người lớn (trên 15 tuổi).
- Liều dùng thông thường: 4 viên mỗi ngày chia làm 2 lần.
- Uống thuốc giữa bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tiền sử dị ứng với thiocolchicoside, colchicine hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ cho con bú.
- Trong 3 tháng đầu thai kỳ.

CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Không dùng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ.
- Nếu đang dùng thuốc mà mang thai, gặp ngay Bác sĩ để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
- Không dùng thuốc khi cho con bú.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

- Sử dụng thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật.
- Khi bị tiêu chảy, báo bác sĩ để điều chỉnh liều dùng.

- Nếu đau dạ dày, báo bác sĩ.

- Do thành phần có sucrose và lactose, không dùng thuốc khi có tăng galactose máu bẩm sinh, không dung nạp fructose, hội chứng kém hấp thu glucose và galactose, thiếu men lactase, sucrase-isomaltase (các bệnh chuyển hóa hiếm gặp).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Rất hiếm gặp: các phản ứng dị ứng (nổi mề đay, phù mắt, sốc phản vệ), các phản ứng ngoài da (ngứa, nổi ban đỏ, phát ban, ban với mụn và bóng nước).
- Hiếm khi có các rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, đau dạ dày.

BẢO QUẢN

Nơi khô thoáng, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SĐK: VD-22638-15

Sản xuất nhượng quyền bởi Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM**
Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam.

Phân phối bởi:

Công ty **Cổ Phần Phân Phối Dược Sài Gòn (SD Pharma)**
72 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM**

702 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39 31 55 18 - Fax: (028) 39 31 55 20



VẠO CỎ



ĐAU THẮT LƯNG