

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Xác nhận nội dung thông tin thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Enzicoba	QLSP-938-16

Đơn đề nghị số: **552/2018/CV-CPC1HN**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội

Hình thức thông tin thuốc: Tài liệu thông tin thuốc

Số giấy xác nhận: **0399/2018/XNTT/QLD**

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt


30



18/5/2018

Tài liệu thông tin thuốc

Enzicoba



Tài liệu này gồm có 02 trang
Thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem ở trang 2
Số giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc của Bộ Y tế
...../XNTT/....., ngày.....tháng.....năm.....
Ngày in tài liệu:/...../.....



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang mềm chứa:	
Nấm men khô chứa selen (Tương ứng với 50 mcg selen)	25 mg
Nấm men khô chứa crom (Tương ứng với 50 mcg crom)	25 mg
Acid ascorbic	50 mg
(Tá dược: Dầu đậu nành, lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, sorbitol, methylparaben, propylparaben, vanillin, titan oxyd, chocolate brown).	

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm.

Hộp 4 vỉ x 15 viên nang mềm.

Hộp 6 vỉ x 15 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Ngăn ngừa quá trình lão hóa.
- Tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống các bệnh dị ứng, ung thư da.
- Cải thiện chức năng gan trong các bệnh gan cấp tính, mạn tính, các tổn thương gan do rượu, bia, thuốc hoặc hóa chất thuốc và hóa chất trong điều trị ung thư.
- Phòng ngừa đục nhân mắt, mờ mắt, căng nhức mắt.
- Bổ sung vitamin C và các nguyên tố vi lượng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng theo đường uống.

Ngày 1 – 2 viên, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Dùng thuốc liên tục 30 ngày. Nên dùng lặp lại 15 ngày sau khi dùng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Dùng thuốc thận trọng với phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể làm cho bệnh Crohn tiến triển xấu. Các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra: Đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Ngưng dùng thuốc các triệu chứng sẽ hết.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Các thuốc ức chế MAO có thể làm giảm hấp thu Enzicoba.

Acid ascorbic có thể làm giảm sinh khả dụng đường uống của propranolol. Do vậy có thể phải hiệu chỉnh liều của propranolol khi dùng đồng thời hai thuốc này.

Các thuốc chống nấm có thể làm giảm khả năng hấp thu selen, crom (trong nấm men).

Các thuốc làm giảm acid dạ dày (antacid) có thể làm giảm khả năng hấp thu của dạ dày đối với selen.

Khi dùng các corticosteroid có thể làm giảm nồng độ selen trong huyết thanh.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có ghi nhận về trường hợp quá liều.

Không nên dùng quá liều chỉ định.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây buồn ngủ, không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

BẢO QUẢN:

Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

SĐK: QLSP-938-16

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM

