

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Salonsip Gel Patch	VD-13185-10

Đơn đề nghị số: 930/201/HVC

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam


Địa chỉ: 14-15 Đường 2A Khu Công nghiệp Biên Hoà II, phường An Bình, TP.
Biên Hoà, Đồng Nai

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0409/2017/XNQC/QLD 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG** 



Nguyễn Tất Đạt

ờ gấp.
o 1:1.



OKUNO MASAYA
Tổng Giám Đốc

Hisamitsu®

SALONSIP GEL-PATCH®

ẢM HIỆU QUẢ
N. CỎ, BẦM TÍM
NG GÂN

- MÁT LẠNH, KHÁNG VIÊM,
GIẢM ĐAU NHANH
- MIẾNG DÁN LỚN
- CỎ GIẢN MỌI HƯỚNG

Cách cắt dán tiện dụng



CỎ, VAI



BẢ VAI



KHỦY TAY



CỎ TAY VÀ
NGÓN TAY CÁI



TÁCH RA
VÀ DÁN CHẬT

23 cm

Ấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế:.../XNQC...,
...tháng.....năm.....
u này có 4 trang, phần thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2.

Salonsip gel patch : Phương tiện quảng cáo: Trên áp phích, tờ rơi,
Tỷ lệ so với kích thước thật: đối với áp phích 1:4, tờ rơi 1:2, tờ gấ

Kích thước mẫu:

30 cm

Hisamitsu®

SALONSIP GEL-PATCH®

**GIẢM HIỆU QUẢ
CĂNG CỠ, BẦM TÍM
BONG GÂN**

- MÁT LẠNH, KHÁNG VIÊM,
GIẢM ĐAU NHANH
- MIẾNG DÁN LỚN
- CÓ GIẢN MỌI HƯỚNG

Cách cắt dán tiện dụng

ĐAU GỐI CỔ CHÂN

GÓT CHÂN BẮP CHÂN

TÁCH RA VÀ DÁN CHẶT

CHO DÁN - GEL SALONSIP Giảm đau
THƯƠNG ĐUO ĐAU - VIÊM KHỚP - VIÊM LƯỠNG ĐƠN THUẬN - VIÊM KHỚP
BẦM TÍM - BONG GÂN - ĐAU LƯỠNG ĐƠN THUẬN - VIÊM KHỚP

SALONSIP GEL-PATCH®

Hisamitsu

MÁT LẠNH

2 MIẾNG

Salonpas®

Cùng nhà sản xuất Hisamitsu của

Trang 4

Salonsip gel patch : Phương tiện quảng cáo: Trên áp phích, tờ rơi,
Tỷ lệ so với kích thước thật: đối với áp phích 1:4, tờ rơi 1:2, tờ gấ

Kích thước mẫu:

30 cm



Hisamitsu®	
Tên thuốc: SALONSIP GEL-PATCH.	
Công thức: Cho 100g cao thuốc/1000 cm ² .	
Hoạt chất: Glycol salicylate... 1.25g; l-Menthol... 1.00g; dl-Camphor... 0.30g; Tocopherol acetate... 1.00g.	
Tà dược: Gelatin, Titanium oxide, Aluminium silicate, Isopropylmethyl phenol, Sodium polyacrylate, Polyglycerol polyglycidylether, Polyacrylic acid, Polyvinyl alcohol, Polyethylen glycol monostearate, Glycerin, nước, hương liệu, vải, màng phim.	
Chỉ định: Dùng giảm đau và kháng viêm trong các cơn đau liên quan đến mô cơ, đau cơ, đau vai, đau lưng đơn thuần, bầm tím, bong gân, căng cơ, viêm khớp.	
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Rửa sạch, lau khô vùng da bị đau, gỡ cao dán ra khỏi tấm phim dán vào chỗ đau. Gỡ miếng cao ra khỏi da sau 8 giờ dán. Không dán quá 3-4 lần trong ngày.	
Tác dụng ngoại ý: Nổi mụn nước, đỏ da, sưng phồng, ngứa, kích ứng da hiếm khi xảy ra. Nếu các triệu chứng trên xảy ra quá mức, việc trị liệu bằng SALONSIP GEL-PATCH phải dừng lại và phải thông báo cho Bác sĩ của bạn.	
Chống chỉ định: Không dán lên vùng da bị tổn thương hoặc vết thương hở. Không sử dụng cho người có tiền sử dị ứng với Aspirin hay nhóm Salicylate.	
Lưu ý: • Chỉ dùng ngoài da. • Không dùng vào mục đích khác ngoài hướng dẫn. • Trước khi sử dụng nên hỏi ý kiến Bác sĩ hay Dược sĩ trong các trường hợp sau: - Bị dị ứng với thuốc dán ngoài da. - Đang dùng thuốc khác. • Trong khi sử dụng, ngưng dùng và hỏi ý kiến Bác sĩ khi: - Tình trạng bệnh trở nên xấu đi. - Triệu chứng bệnh hết rồi tái phát vài ngày sau đó. - Xảy ra kích ứng da quá mức, nổi mụn nước, ngứa. • Khi sử dụng thuốc này tránh tiếp xúc với mắt, niêm mạc, mụn trứng cá. Không dùng chung thuốc này với băng dán nóng. Để thuốc tránh xa tầm với của trẻ em. Nếu lỡ nuốt phải, hãy đến ngay trạm y tế gần nhất. Bao bì không phòng tránh được trẻ em.	
Tương tác với thuốc khác: Có tương tác hỗ trợ với các thuốc giảm đau khác.	
Tính tương kỵ: Không phát hiện.	
Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú: Hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng.	
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không tác động.	
Đặc tính dược động học: Hấp thu qua da.	
Đặc tính dược lực học: Nhiều tác động kích thích dây chuyền được chỉ định rõ trong tác dụng giảm đau. Thuốc kháng viêm dạng Non steroidal (NSAIDs).	
Điều kiện bảo quản: Bảo quản thuốc nơi mát, tránh ánh sáng trực tiếp.	
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc quá hạn dùng.	
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam Số 14 -15 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.	
SĐK: VD-13185-10.	

ờ gấp.
o 1:1.



Nisamitsu®

SALONSIP GEL-PATCH®

Cách cắt dán SALONSIP tiện dụng

CHO CỔ, VAI

Cố định vào điểm đau ở vai rồi kéo giãn đến điểm đau ở cổ.



CHO BẮT VAI

Chú ý lên cơ hình tam giác và cơ hình thang, tập trung vào móm cùng vai.



CHO ĐẦU GỐI

Chú ý qua chóp đầu gối và bao quanh vùng đau.



CHO CỔ CHÂN

Chú ý 1/2 một bên mắt cá chân.



23 cm

