

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:


STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Phosphalugel	VN-16964-13

Đơn đề nghị số: 63-10/QC/SNF/HEC-RA2017

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp VN-Singapore, phường Bình Hòa,
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Phương tiện quảng cáo: Trên pano, áp phích cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0923 /2017/XNQC/QLD 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 



Nguyễn Tất Đạt

05/11/18



Handwritten signature or mark.

Phosphalugel®

Giảm axit dạ dày hiệu quả



CÁC KÍCH THƯỚC XIN
QUẢNG CÁO KV DỌC:

- Pano, áp phích: 42cm x 29.7cm;
29.7cm x 21 cm; 800cm x 2000cm

Nóng rát **Khó chịu** **Đau dạ dày**

Hoạt chất: Colloidal aluminium phosphate gel 20%: 12,380 g/gói. **Chỉ định:** Phosphalugel là một thuốc kháng axit. Nó làm giảm độ axit của dạ dày. Thuốc được sử dụng để điều trị cơn đau, nóng rát và tình trạng khó chịu do axit gây ra ở dạ dày hoặc thực quản. **Liều lượng và cách dùng:** 1 - 2 gói uống 2 - 3 lần/ngày. Nên uống thuốc khi xuất hiện cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Dùng hơn 6 gói mỗi ngày thường không đem lại lợi ích gì thêm. Nếu triệu chứng không giảm với liều dùng 6 gói mỗi ngày thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Quá mẫn (dị ứng) với aluminium phosphate hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc bệnh thận nặng. **Thận trọng:** Bệnh nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose thì không nên dùng thuốc này. Thuốc này chứa sorbitol nên có thể gây ảnh hưởng nhẹ trên đường tiêu hóa (tiêu chảy). Hỏi ý kiến bác sĩ ngay nếu đau kèm theo sốt hoặc nôn hoặc nếu các triệu chứng không hết sau 7 ngày. **Thai kỳ và cho con bú:** Nên sử dụng thuốc thận trọng trong thời gian mang thai và cho con bú. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. **Tương tác:** Thuốc kháng axit có thể LÀM GIẢM tác dụng của nhiều thuốc khác. Hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những thuốc bạn đang sử dụng. Nên thận trọng không uống thuốc kháng axit cùng lúc với thuốc khác. Nên uống các thuốc khác riêng biệt với thuốc kháng axit (ví dụ uống trước đó 2 giờ). **Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Không có báo cáo. **Tác dụng phụ có thể xảy ra:** Cũng như tất cả các thuốc, Phosphalugel dạng hỗn dịch uống có thể gây tác dụng phụ mặc dù không phải ai cũng gặp phải. **Các tác dụng phụ có thể gặp:** Táo bón. Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên trầm trọng hoặc nếu bạn bị bất kỳ tác dụng phụ nào mà không được nêu trong tờ hướng dẫn này. **Hãy thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải trong thời gian dùng thuốc.** **Quá liều:** Uống nhiều thuốc có thể gây táo bón hoặc thậm chí tắc ruột. Quá liều thường gây ảnh hưởng trên những bệnh nhân suy chức năng thận. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **Quy cách đóng gói:** Gói đơn liều hỗn dịch để uống; hộp 26 gói, mỗi gói 20g. **Số Visa:** VN-16964-13. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **Mọi thông tin sản phẩm xin liên hệ:** Công ty TNHH DKSH Việt Nam: Lầu 2, tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.ĐT: (028) 3812 5848 **Nhà nhập khẩu:** Vimedimex Bình Dương. Địa chỉ: 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore 2, P. Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3815 062 - Fax: (0650) 3815 063. **Nhà sản xuất:** Pharmatis, Z.A. Est no 1, 60 190 Estrees-Saint-Denis, Pháp. SÁVN.PHOS.17.09.007

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC... Ngày ... tháng ... năm ...