

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Lactosorbit	VD-24242-16

Đơn đề nghị số: 35/OPV-QC

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Địa chỉ: Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, An Bình, Biên Hoà,
Đồng Nai

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, internet cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0425/2017/XNQ/QLD-

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Lactosorbit®

Điều Trị Triệu Chứng Táo Bón

LACTOSORBIT®

Sorbitol 5g - Thuốc bột để uống

Thành phần: Mỗi gói chứa: Sorbitol...5 g. **Mô tả sản phẩm:** Thuốc bột đồng nhất, khô, rời, màu trắng, không mùi, vị ngọt. **Dược động học:** Sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, sau khi uống hoặc đặt trực tràng. Một phần rất nhỏ sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO₂ khi thở ra trong quá trình hô hấp. **Chỉ định:** Điều trị triệu chứng táo bón. **Cách dùng - liều dùng:** Pha 1 gói thuốc trong nửa ly nước, và uống. Người lớn: Uống 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em: uống 1/2 liều người lớn. **Chống chỉ định:** Viêm đại tràng thực thể (Viêm loét đại – trực tràng, bệnh Crohn), hội chứng tắc ruột hay bán tắc, đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Vô niệu. Tắc đường dẫn mật. Người bệnh không dung nạp fructose do di truyền (bệnh chuyển hóa hiếm gặp). **Lưu ý và thận trọng:** Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Điều trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho phương pháp điều trị bằng chế độ ăn uống. Ở người bệnh "đại tràng kích thích" tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều. Dùng thận trọng cho người bị phình đại tràng vì nhu động đại tràng có thể bị thay đổi, gây u phân. **Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú:** Chưa có báo cáo. **Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có báo cáo. **Tác dụng không mong muốn:** Tiêu chảy, đau bụng, đặc biệt ở bệnh nhân có hội chứng ruột bị kích thích. Đau bụng. **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.** **Tương tác thuốc:** Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này. **Quá liều và xử trí:** Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần. **Trình bày:** Hộp 20 gói x 5 g. **Bảo quản:** Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi hết hạn sử dụng. **Ngày xét lại tờ hướng dẫn sử dụng:** Để xa tầm tay trẻ em. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Không dùng quá liều chỉ định. **Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.**

Nhà sản xuất và phân phối: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV**

Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 3992999 | Fax: (0251) 3835088

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của bộ y tế:
...../XNQC....., ngày.....tháng.....năm.....



WHO-GMP

