

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Phosphalugel	VN-16964-13

Đơn đề nghị số: 56-10/QC/SNF/HEC-RA2017

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: 23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, P. Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích cho công chúng

Số giấy xác nhận: ~~0443~~ 2017/XNQ/QLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**




Nguyễn Tất Đạt

HS 56



Phosphalugel®

Giảm axit dạ dày hiệu quả



Nóng rát Khó chịu Đau dạ dày

Hoạt chất: Colloidal aluminum phosphate gel 20%. **Chỉ định:** Phosphalugel là một thuốc kháng axit. Nó làm giảm độ axit của dạ dày. Thuốc được sử dụng để điều trị cơn đau, buồn rầu và tình trạng khó chịu do axit gây ra ở dạ dày hoặc thực quản. **Liều lượng và cách dùng:** 1 - 2 gói uống 2 - 3 lần/ngày. Nên uống thuốc khi xuất hiện cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Dùng hơn 6 gói mỗi ngày thường không đem lại lợi ích gì thêm. Nếu triệu chứng không giảm với liều dùng 6 gói mỗi ngày thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Quá mẫn (dị ứng) với aluminum phosphate hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc bệnh thận nặng. **Thận trọng:** Bệnh nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose thì không nên dùng thuốc này. Thuốc này chứa sorbitol nên có thể gây ảnh hưởng nhẹ trên đường tiêu hóa (liều chảy). **Hỏi ý kiến bác sĩ ngay** nếu đau kèm theo sốt hoặc nôn hoặc nếu các triệu chứng không hết sau 7 ngày. **Thay lý & cho con bú:** Nên sử dụng thuốc thận trọng trong thời gian mang thai và cho con bú. **Tương tác:** Thuốc kháng axit có thể làm giảm tác dụng của nhiều thuốc khác. Hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những thuốc bạn đang sử dụng. Nên thận trọng không uống thuốc kháng axit cùng lúc với thuốc khác. Cần uống như tất cả các thuốc biết với thuốc kháng axit (ví dụ uống trước đó 2 giờ). **Anh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Không có báo cáo. **Tác dụng phụ có thể xảy ra:** Cũng như tất cả các thuốc, Phosphalugel dạng hỗn dịch uống có thể gây tác dụng phụ mà không phải ai cũng gặp phải. **Các tác dụng phụ có thể gặp:** Táo bón. Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên trầm trọng hoặc nếu bạn bị bất kỳ tác dụng phụ nào mà không được nêu trong tờ hướng dẫn này. **Hãy thông báo** cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải trong thời gian dùng thuốc. **Quá liều:** Uống nhiều thuốc có thể gây táo bón hoặc thậm chí tắc ruột. Quá liều thường gây ảnh hưởng nhẹ đến những bệnh nhân suy chức năng thận. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **Quy cách đóng gói:** Gói đơn liều hỗn dịch để uống, hộp 26 gói, mỗi gói 20g. **Số Visa:** VN-16964-13. **Độc lý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:** Mọi thông tin sản phẩm xin liên hệ: Công ty TNHH DKKH Việt Nam, Tầng 2, tòa nhà Etown 2, 364 Công Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.ĐT: (028) 3812 5848 **Nhà nhập khẩu:** Winmedimex Bình Dương, Địa chỉ: 18 L1-7/VSP II, đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore 2, P. Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (06550) 3815 062 - Fax: (06550) 3815 063. **Nhà sản xuất:** Pharmabio ZA, Est no 1, 601 Estrée-Saint-Denis, Pháp. SANPHOS-17.09.006

CÁC KỊCH THUỐC XIN
QUẢNG CÁO KV NGANG:

- Pano, áp phích: 29,7cm x 42cm;
21cm x 29,7cm; 14,8cm x 21cm;
2000cm x 800cm.