

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	V.Rohto Vitamin	VD-21569-14

Đơn đề nghị số: **RMV03/11/17-QC**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam**

Địa chỉ: **16 VSIP đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương**

Phương tiện quảng cáo: **Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0497/2017/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày **27** tháng **02** năm **2018**

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



V.ROHTO®
VITAMIN

HỖ TRỢ CẢI THIẾN TÌNH TRẠNG GIẢM THỊ LỰC

Na
Sodium
Chondroitin
Sulfate

E

K
Potassium
L-Aspartate

B6



Mắt mờ (do tiết dịch) khiến sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Thuốc nhỏ mắt V.Rohto Vitamin với Vitamin E, B6, Sodium Chondroitin Sulfate, Potassium L-Aspartate hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CHỈ ĐỊNH: • Hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực. • Mắt mờ (do tiết dịch). • Mắt mỏi mệt. • Phòng ngừa các bệnh về mắt (do bơi lội hoặc bụi, mồ hôi rơi vào mắt). • Xung huyết kết mạc. • Ngứa mắt. • Viêm mí mắt. • Viêm mắt do tia tử ngoại hoặc do các tia sáng khác (như mù tuyết). • Cảm giác khó chịu khi sử dụng kính tiếp xúc cứng. **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Mỗi ngày nhỏ 5-6 lần, mỗi lần 2-3 giọt. **THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT** (trong 13 ml): Potassium L-Aspartate 130,0 mg, Pyridoxine Hydrochloride 13,0 mg, Sodium Chondroitin Sulfate 13,0 mg, d- α -Tocopherol Acetate 6,5 mg, Chlorpheniramine Maleate 3,9 mg (*). Không chứa thành phần bảo quản. **THÀNH PHẦN TÁ ĐƯỢC:** Boric Acid, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60, Sodium Borate, l-Menthol, d-Borneol, Disodium Edetate, Eucalyptus Oil, Nước tinh khiết. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc. **LƯU Ý SỬ DỤNG:** 1/Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng, có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt, đau mắt nặng hoặc đang theo một quá trình điều trị. 2/Trước khi dùng thuốc, chú ý: Trẻ em dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của người lớn. Không để mí mắt hay lông mi chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm đục dung dịch do các chất tiết hoặc mầm vi sinh vật. Chỉ dùng để nhỏ mắt. 3/Ngưng dùng sản phẩm, đem tờ hướng dẫn này đến hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trong những trường hợp sau: Sau khi sử dụng: ngoài da bị phát ban, mẩn đỏ, ngứa; mắt bị đỏ, ngứa, sưng tấy, đau nhức. Tình trạng mờ mắt không được cải thiện. Hoặc các triệu chứng không thuyên giảm sau 2 tuần sử dụng sản phẩm. 4/Những lưu ý khi bảo quản và sử dụng: Vặn chặt nắp lọ sau khi dùng. Để tránh nhiễm bẩn và giảm chất lượng, không đựng thuốc vào chai lọ khác. Không dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh lây nhiễm. **QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ:** Dùng đúng liều quy định, nếu quá liều có thể gây xung huyết. Nếu xảy ra, ngưng sử dụng, xin theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ, tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc nhỏ mắt khác. **TÁC DỤNG NGOẠI Ý:** Thuốc có thể gây dị ứng như ngứa mắt, xung huyết trong một số trường hợp. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**



ROHTO
www.rohto.com.vn

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

16 VSIP, đường số 5, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương • Email: enquiries@rohto.com.vn

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược:....., ngày... tháng... năm.... Ngày... tháng... năm... in tài liệu

