

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Decolgen Forte	VD-21573-14

Đơn đề nghị số: 473/UIP-2017

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: Số 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, bảng biển, internet, phương tiện giao thông và phương tiện ngoài trời cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0502/2017/XNQ/QLD

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



**NHỨC
SỐ MŨI
NHỨC**



Decolgen®

ĐIỀU TRỊ 3 TRIỆU CHỨNG CẢM

HẮT HƠI, SỐ MŨI, NHỨC ĐẦU



Thành phần: Paracetamol (Acetaminophen) 500 mg, Phenylephrine Hydrochloride 10 mg, Chlorpheniramine Maleate 2 mg. **Chỉ định:** Điều trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch, viêm màng nhầy xuất tiết đỏ sưng, viêm xoang và các rối loạn của đường hô hấp trên. **Liều lượng và Cách dùng:** (tổng 3 hay 4 lần một ngày sau khi ăn): Người lớn: 1-2 viên/lần, tối đa 6 viên/24 giờ. Trẻ em: 2-6 tuổi: 1/2 viên/lần, tối đa 1,5 viên/24 giờ; 7-12 tuổi: 1/2-1 viên/lần, tối đa 3 viên/24 giờ. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **Chống chỉ định:** Không dùng với bệnh nhân: nhạy cảm với các thành phần của thuốc, suy gan, thận nặng, tăng huyết áp, hen cấp, Thận trọng: Cũng như các thuốc cường giao cảm khác, nên sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị cường giáp, đau thắt ngực, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Paracetamol (acetaminophen) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoài ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn cảm nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. **Anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** thuốc này có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, buồn ngủ. Nếu bị ảnh hưởng, người bệnh không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. **Tác dụng phụ:** Paracetamol (acetaminophen) tương đối không độc ở liều điều trị. Phản ứng ngoài da gồm ban sẩn ngứa và mề dầy hiếm khi được ghi nhận. Thuốc có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, đặc biệt ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với các tác động của thuốc cường giao cảm. Tác dụng an thần thay đổi từ ngày ngất đến ngủ sâu có thể xảy ra nhưng sẽ giảm sau vài ngày. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc. **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Việc sử dụng thuốc an toàn trong khi mang thai chưa được chứng minh. Thuốc có thể đi vào sữa mẹ do đó không nên sử dụng cho những phụ nữ đang cho con bú do trẻ sơ sinh có thể quá nhạy cảm với tác động của thuốc. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Sản xuất tại: Công ty TNHH United International Pharma, số 16, đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, P. Hòa Phú, TP. TDM. Bình Dương, Việt Nam, ĐT: 028-39621000. Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế:/XNQC....., ngày... tháng... năm.... Tỷ lệ kích thước so với mẫu nộp: 1:0,25; 1:0,5; 1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:30