

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Rhinex 0,05%	VD-23085-15

Đơn đề nghị số: 95/1217BR

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Địa chỉ: Số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi, Internet cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0506 /2017/XNQCLD 

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG** 



Nguyễn Tất Đạt





Thuốc nhỏ mũi - Thuốc xịt mũi

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
OPC

Rhinex

0,05%

Giảm triệu chứng và sưng huyết
trong trường hợp:

- Viêm mũi cấp hoặc mạn tính
- Viêm xoang,
- Cảm lạnh, dị ứng



Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y Tế:
...../...../XNQC, ngày...../...../.....
Tài liệu này có 2 trang, thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang 2

Sản phẩm được tiếp thị và phân phối bởi:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM. ĐT: 37517111. Fax: 38752048
Website: www.opcpharma.com Email: info@opcpharma.com

1

Thuốc nhỏ mũi - Thuốc xịt mũi

Rhinex 0,05%

THÀNH PHẦN: Chai 15ml:

- Naphazolin nitrat (tương ứng Naphazolin 5,8 mg) 7,5mg
- Tá dược (Methyl hydroxybenzoat 0,03%, Propyl hydroxybenzoat 0,01%, Natri clorid, Nước cất)

CHỈ ĐỊNH:

Dùng nhỏ mũi hoặc xịt để giảm triệu chứng và giảm sưng huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm lạnh, dị ứng.

- Dùng để giảm sưng, để quan sát niêm mạc mũi họng trước khi phẫu thuật, làm thông lỗ vòi nhĩ bị tắc ở người bệnh viêm tai.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Nhỏ 1 - 2 giọt hoặc xịt 1 liều vào mỗi bên mũi, 3 - 6 giờ một lần nếu cần. Thời gian dùng không nên quá 3 - 5 ngày.

Chai thuốc đã mở nắp, chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày.

*** Cách sử dụng bình xịt:** Để bình ở vị trí thẳng đứng, nắp ở phía trên. Lắc chai thuốc vài lần. Cho đầu chai vào mũi và bấm nhanh, mạnh vào nút bấm ở phía trên. Rút đầu chai ra trước khi thả nút bấm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với thành phần của thuốc. Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Người bệnh Glôcôm.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú: Chỉ nên dùng thuốc khi thật cần thiết.

THẬN TRỌNG: Bệnh nhân cường giáp, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đau thắt ngực, người đang dùng các chất ức chế monoamin oxidase. Ngưng thuốc và khám bệnh bác sĩ nếu vẫn ngẹt mũi dai dẳng sau 3 ngày điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, phản ứng sung huyết trở lại nếu dùng lâu ngày. Có thể xảy ra các phản ứng toàn thân.

- Thường gặp: Kích ứng tại chỗ.

- Ít gặp: Cảm giác bỏng, rất, khô niêm mạc, hắt hơi, giãn đồng tử, nhìn mờ.

- Hiếm gặp: Buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, đánh trống ngực.



Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Các trang Website/ internet:
· Quảng cáo tỉnh