

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	V.Rohto Dryeye	VD-21160-14

Đơn đề nghị số: **RMV05/12/17-QC**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam**

Địa chỉ: **16 VSIP đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương**

Phương tiện quảng cáo: **Trên báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp phích, băng rôn, phương tiện giao thông cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0507/2017/XNQCLD**

Hà Nội, ngày **27** tháng **3** năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Bạn đang gặp các
DẤU HIỆU CỦA KHÔ MẮT?

V.ROHTO[®]
DRYEYE



NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

CÔM CÔM

XÓN XÓN

RẤT RẤT

CÂY CÂY

CAY CAY

CÔM CÔM

XÓN XÓN

CÔM CÔM

CÂY CÂY



CUNG CẤP ĐỘ ẨM

V.ROHTO DRYEYE

Với Hydroxyethylcellulose (HEC), bổ sung nước mắt nhân tạo, giúp tạo độ ẩm cho mắt.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT: Hydroxyethylcellulose (HEC) 78,0 mg. **CHỈ ĐỊNH:** Bổ sung nước mắt nhân tạo để tạo độ ẩm cho mắt khô, mắt mỏi, mắt mờ (do có nhiều ghèn), giảm cảm giác khó chịu khi sử dụng kính sát tròng. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc. **LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:** • Nhỏ mắt mỗi lần 1-2 giọt, mỗi ngày 3-4 lần. Có thể nhỏ nhiều lần hơn nếu cần. • Do dung dịch thuốc nhỏ mắt có độ nhớt cao để duy trì độ ẩm cho mắt, xin lưu ý sau khi nhỏ mắt sẽ thấy mắt có tình trạng mờ trong chốc lát. • Có thể dùng thuốc khi đang mang kính sát tròng. **LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:** (1). Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng trong các trường hợp: Đang theo một quá trình điều trị, có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt, đau mắt nặng, tăng nhãn áp. (2). Trước khi dùng thuốc, chú ý: Trẻ em dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của người lớn, chỉ dùng thuốc này để nhỏ mắt. (3). Trong và sau khi dùng: Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ nếu thuốc gây xung huyết mắt, ngứa, sưng, đau nhức hoặc các triệu chứng khác; không khỏi mờ mắt và các triệu chứng khác không cải thiện sau khi dùng. (4). Một vài chất có thể kết tinh ở miệng lọ do điều kiện bảo quản, lau miệng lọ bằng gạc sạch trước khi dùng, không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vẩn đục dung dịch. Không đổ dung dịch khác vào vỏ chai V.Rohto Dryeye để sử dụng. Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Thuốc có thể gây dị ứng như ngứa mắt, xung huyết trong một số trường hợp. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**



CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

16 VSIP, đường số 5, KCN VN - Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương • Tư vấn khách hàng: (028) 3822 9322 • Email: enquiries@rohto.com.vn
Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược:, ngày ... tháng ... năm 2018. Ngày ... tháng ... năm 2018 in tài liệu.

