

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Parazacol 150, Parazacol 250	VD-28089-17, VD-28090-17

Đơn đề nghị số: **01/E-U PHARCO**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty cổ phần dược phẩm Quốc tế E-U PHARCO**


Địa chỉ: **160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội**

Phương tiện quảng cáo: **Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0524/2018/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt



Parazacol



13/7/2018
K



GIẢM ĐAU NHANH



HẠ SỐT



PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ E-U PHARCO

160 Tôn Đức Thắng - P. Hàng Bột - Q. Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 02432.444.508



66 Giải Phóng - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP HCM
Điện thoại: 02836.208.029

www.eupharco.com

Thành phần: Paracetamol: 250mg hoặc 150mg; Tá dược: Lactose 200 mesh, Mannitol, Aspartam, Sucralose, Dextrin, Natri bicarbonat, Natri carbonat, Acid citric khan, Bột mùi cam... vừa đủ 1 gói. **Chỉ định:** Paracetamol được dùng trong các trường hợp đau từ nhẹ đến vừa hoặc/và sốt; Đau: được dùng giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa, có hiệu quả nhất là làm giảm đau cường độ thấp có nguồn gốc không phải nội tạng, Parazacol không có tác dụng trị thấp khớp; Sốt: Paracetamol được sử dụng để giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt do mọi nguyên nhân nhưng không làm giảm thân nhiệt ở người bình thường. **Cách dùng:** Đổ gói bột vào cốc đã có sẵn 5-10ml nước đun sôi để nguội, khuấy đều và uống ngay. Tráng cốc bằng một ít nước rồi uống. **Liều dùng:** Người lớn có trọng lượng trên 50kg: 0,5-1g/mỗi lần 4-6 giờ; Người lớn từ 33 đến 50kg: 0,5g-0,75g/mỗi lần 4-6 giờ; Trẻ em từ 10 đến 33kg: 250mg-500mg/mỗi lần 4-6 giờ; Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 10kg: 250mg/mỗi lần 4-6 giờ. **Chống chỉ định:** Người có bệnh tim, phổi, suy gan nặng, suy thận, thiếu máu nặng; Mẫn cảm với paracetamol hoặc các thành phần của chế phẩm; Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase. **Tác dụng không mong muốn:** Đôi khi xảy ra ban da và những phản ứng dị ứng khác. Thường là ban đỏ hoặc ban mề đay, nặng hơn có thể kèm theo sốt do thuốc và do tổn thương niêm mạc. Người bệnh mẫn cảm với salicylat hiếm khi mẫn cảm với paracetamol và những thuốc có liên quan. **Thận trọng và lưu ý khi dùng thuốc:** Sử dụng thận trọng trong các trường hợp: người bệnh thiếu máu, suy gan, suy thận nặng, bệnh nhân hiếm gặp có vấn đề di truyền về dung nạp galactose, bệnh nhân có phenylketon niệu. Phụ nữ có thai: chỉ nên dùng Paracetamol ở người mang thai khi thật cần. Phụ nữ cho con bú: không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ. Người lái xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây buồn ngủ, do đó cần thận trọng đối với người lái xe và vận hành máy móc.

Sản phẩm của Công ty dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco. Sản xuất tại: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam.

ĐỂ XA TÁM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC... ngày .../.../2018

