

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung thông tin thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Bustidin 20	VD-24996-16

Đơn đề nghị số: 473/CV-RVN

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Roussel Việt Nam

Địa chỉ: 702 Trường Sa, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hình thức thông tin thuốc: Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Số giấy xác nhận: 0531/2017/XNTT/QLD 

Hà Nội, ngày 13. tháng 02 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Tất Đạt






Bustidin® 20

Trimetazidin hydrochlorid 20 mg

LIỆU PHÁP HỖ TRỢ vào biện pháp trị liệu hiện có để
ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐAU THẮT NGỰC
ở người lớn bị đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ
hoặc không dung nạp với liệu pháp điều trị đau thắt ngực đầu tay



Bustidin® 20 hiện đang có bán
tại các nhà thuốc trên toàn quốc

ROUSSEL VIETNAM

[Handwritten signature]

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

Tài liệu thông tin thuốc

THÀNH PHẦN: Trimetazidin dihydroclorid 20mg. Tá dược v.d: 1 viên. **DẠNG TRÌNH BÀY:** Hộp 2 vỉ x 30 viên nên bao phim. **CHỈ ĐỊNH:** Chỉ định cho người lớn trong liệu pháp bổ sung/hỗ trợ vào biện pháp trị liệu hiện có để điều trị triệu chứng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ, hoặc bệnh nhân không dung nạp với các liệu pháp điều trị đau thắt ngực đầu tay. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân Parkinson, có triệu chứng Parkinson, run, hội chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan khác. Suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút). **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Cách dùng: Thuốc uống, dùng cùng bữa ăn. Liều lượng: 1 viên x 3 lần/ngày. Người bị suy thận mức độ trung bình (độ thanh thải creatinin 30-60 ml/phút): 1 viên x 2 lần/ngày, sáng và tối. Người cao tuổi: cần thận trọng khi tính toán liều dùng. Trẻ em: không có dữ liệu trên đối tượng bệnh nhân này. **THẬN TRỌNG KHI DÙNG:** Không nên sử dụng ở giai đoạn trước nhập viện và những ngày đầu nhập viện. Không dùng thuốc này cho bệnh nhân đang lên cơn đau ngực. Không dùng thuốc này để điều trị khởi đầu cơn đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim. Sử dụng cho người cao tuổi cần phải kiểm tra và theo dõi thường xuyên vì trimetazidin có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng Parkinson (run, vận động chậm và khó khăn, tăng trương lực cơ). Khi gặp phải các rối loạn vận động như các triệu chứng Parkinson, hội chứng chân bứt rứt, run, dancing đi không vững cần ngay lập tức ngừng sử dụng trimetazidin. Các trường hợp này ít xảy ra và thường hồi phục sau khi ngưng thuốc. Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau khi ngừng thuốc khoảng 4 tháng. Nếu các triệu chứng Parkinson tiếp tục xảy ra quá 4 tháng sau khi dừng thuốc, cần tham vấn các bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp, có thể gặp biểu hiện ngã, dáng đi không vững hoặc tụt huyết áp. Cần thận trọng khi kê đơn trimetazidin cho đối tượng bệnh nhân có mức độ nhạy cảm cao: bệnh nhân suy thận mức độ trung bình, bệnh nhân trên 75 tuổi. Thuốc có chứa Lactose, do đó không nên dùng cho bệnh nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp khiến cho không dung nạp được galactose, bị thiếu men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose. Ponceau 4R, erythrosine red trong thành phần thuốc có thể gây các phản ứng dị ứng. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Tốt nhất không nên dùng. **LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Có thể gây các triệu chứng như chóng mặt và lơ mơ, do vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Để tránh các tương tác có thể xảy ra, phải luôn báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ mọi thuốc khác đang dùng. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Thường gặp: Thần kinh trung ương: chóng mặt, đau đầu. Dạ dày-ruột: đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn và nôn. Da và mô dưới da: mẩn ngứa, mày đay. Toàn thân: suy nhược. Hiếm gặp: Tim: đánh trống ngực, hồi hộp, ngoại tâm thu, tim đập nhanh. Mạch: hạ huyết áp động mạch, tụt huyết áp thể đứng, có thể dẫn đến khó chịu, chóng mặt hoặc ngã, đặc biệt ở các bệnh nhân đang điều trị bằng các thuốc chống tăng huyết áp, độ bưng mắt. Không rõ: Thần kinh trung ương: triệu chứng Parkinson (run, vận động chậm và khó khăn, tăng trương lực cơ), dáng đi không vững, hội chứng chân không nghỉ, các rối loạn vận động có liên quan khác, thường có thể hồi phục sau khi dừng thuốc. Dạ dày-ruột: táo bón. Máu và hệ bạch huyết: mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, ban xuất huyết giảm tiểu cầu. Gan mật: viêm gan. Da và mô dưới da: ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP), phù mạch. **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Thông báo ngay cho bác sĩ. **BÁO QUẢN:** nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Sản xuất theo TCCS. **SĐK: VD-24996-16. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** Sản xuất tại Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM** Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM** - 702 Trường Sa, P. 14, Q.3, Tp HCM - ĐT: (028) 39 31 55 18 - Fax: (028) 39 31 55 20

Số giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc của BYT: ...XNTT.../.../..., ngày ..tháng...năm... Ngày in tài liệu:

www.rousselvietnam.com.vn



